

Universidad Católica de Santa María
Facultad de Medicina Humana
Escuela Profesional de Medicina Humana



**FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN
EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD
MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 - 2021**

Tesis presentada por las
Bachilleres:

Peralta Muñoz, Vanessa

Octavia

Huanca Porcela, Flor de María

Para optar el Título Profesional
de:

Médico Cirujana

Asesora:

**Dra. Muñoz del Carpio Toia,
Agueda**

Arequipa- Perú

2022

UCSM-ERP

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
MEDICINA HUMANA
TITULACIÓN CON TESIS
DICTAMEN APROBACIÓN DE BORRADOR

Arequipa, 19 de Julio del 2022

Dictamen: 006940-C-EPMH-2022

Visto el borrador del expediente 006940, presentado por:

2014162012 - PERALTA MUÑOZ VANESSA OCTAVIA

2015700072 - HUANCA PORCELA FLOR DE MARIA

Titulado:

**FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID
19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 - 2021**

Nuestro dictamen es:

APROBADO

**1147 - MEDINA VASQUEZ MANUEL EDWIN
DICTAMINADOR**



**1424 - NUÑEZ BERNAL CESAR AUGUSTO
DICTAMINADOR**



**2545 - QUIÑONES HERMOSA ANGELA GRISELDA
DICTAMINADOR**



DEDICATORIA

Dedicado principalmente a Dios, por ser el inspirador y darme la fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de mis anhelos más deseados.

A mi madre Julia Carmen, por su gran apoyo incondicional, por su ejemplo de lucha y esfuerzo, a quien estaré eternamente agradecida.

A mis tíos Nora y Fernando, que me apoyaron siempre para poder desarrollarme como profesional y como persona.

A todos los médicos y compañeras(os) que me infundieron con sus enseñanzas, su conocimiento y su experiencia.

A todas las demás personas por apoyarme y darme fuerzas.

FLOR

A Dios por su infinita bondad para conmigo y los míos

A mis maravillosos padres Luis y Hada y hermana Fiorella que con su amor, enseñanza y apoyo incondicional me hicieron lo que soy y me dieron todo cuanto tengo, siempre juntos en las inevitables pruebas y dificultades de la existencia como en los momentos de alegría conociendo las cosas más bellas y mejores en el Mundo, esas que no se pueden ver ni tocar, pero se pueden sentir en el corazón

A Médicos, docentes, amigos (as), que me mostraron de alguna forma su aprecio; todos ellos personas de altos ideales que me motivaron a seguir adelante y apoyaron a realizar mis sueños

VANESSA

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Católica de Santa María, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Medicina Humana y a sus docentes por la formación e instrucción impartida, dejan imborrables recuerdos y hermosas enseñanzas en nuestras memorias.


Con aprecio y profunda gratitud a nuestra Docente y Asesora de Tesis Dra. Agueda Muñoz del Carpio Toia, Por su invaluable apoyo y dedicación

A nuestros queridos docentes y dictaminadores; Dr. César Núñez, Dra. Ángela Quiñones, Dr. Manuel Medina por su dedicación, apoyo y estímulo continuo.

A todas las personas que de alguna manera contribuyeron al logro de este objetivo en especial al personal que laboró y labora actualmente en el área COVID del Centro de Salud de Mariano Melgar.

FLOR Y VANESSA

EPÍGRAFE



“A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón”

Confucio

RESUMEN

OBJETIVO: Identificar los factores determinantes relacionados a la automedicación en pacientes COVID 19 atendidos en el Centro de salud "Mariano Melgar" Arequipa, 2020 – 2021.

MÉTODOS: Se realizó un trabajo descriptivo, retrospectivo, observacional, transversal, de campo, relacional y correlacional. La población de estudio fue de 2500 pacientes con un tamaño muestral de 216 pacientes COVID 19. Encuesta aplicada a pacientes sobre sus episodios de COVID 19 2020 – 2021. Se analizó datos con la prueba Chi cuadrado obteniendo la relación entre variables e índice de Phi de Cramer hallando la correlación.

RESULTADOS: Se muestra una práctica de la automedicación alta (83.3%), entre las características sociodemográficas solo la edad tiene una relación significativa con la práctica de automedicación ($p < 0.05$), los factores como género (femenino 45.4%), grado de instrucción (nivel básico 50%) y ocupación (independiente 39.4%) presentan correlación con la práctica de automedicación. Los factores referidos a las características de la enfermedad, el 57.9% presentaron comorbilidades, principalmente el sobrepeso (34.3%), obesidad (20.4%), existe una correlación entre la comorbilidad y la práctica de automedicación (phi Cramer 0.179). Se halló la preferencia de plantas medicinales (28.7%), seguida del paracetamol (26.9%), ivermectina (19%), dióxido de cloro (10.1%), antibióticos como azitromicina (9.2%). En donde, esta práctica es realizada en su mayoría por decisión propia (78.8%).

CONCLUSIONES: Los factores sociodemográficos que tienen relación con la automedicación, solo la edad tiene una relación significativa, el resto presenta cierto grado de correlación con la práctica de automedicación. Las sustancias más usadas fueron plantas medicinales, paracetamol e ivermectina.

Palabras clave: Automedicación, COVID 19, factores.

ABSTRACT

OBJECTIVE: To identify the determinant factors related to self-medication in COVID 19 patients attended at the "Mariano Melgar" Arequipa Health Center, 2020 - 2021.

METHODS: A descriptive, retrospective, observational, cross-sectional, field, relational and correlational study was carried out. The study population was 2500 patients with a sample size of 216 patients COVID 19. Survey applied to patients about their episodes of COVID 19 2020 - 2021. Data were analyzed with the Chi-square test to obtain the relationship between variables and Cramer's Phi index to find the correlation.

RESULTS: It shows a high practice of self-medication (83.3%), among the sociodemographic characteristics only age has a significant relationship with the practice of self-medication ($p < 0.05$), factors such as gender (female 45.4%), educational level (basic level 50%) and occupation (independent 39.4%) are correlated with the practice of self-medication. The factors referred to the characteristics of the disease, 57.9% presented comorbidities, mainly overweight (34.3%), obesity (20.4%), there is a correlation between comorbidity and the practice of self-medication (phi Cramer 0.179). Preference was found for medicinal plants (28.7%), followed by paracetamol (26.9%), ivermectin (19%), chlorine dioxide (10.1%), antibiotics such as azithromycin (9.2%). Where, this practice is mostly performed by own decision (78.8%).

CONCLUSIONS: The sociodemographic factors that are related to self-medication, only age has a significant relationship, the rest present a certain degree of correlation with the practice of self-medication. The most used substances were medicinal plants, paracetamol and ivermectin.


Key words: Self-medication, COVID 19, factors.

ÍNDICE

RESUMEN	vi
ABSTRACT	vii
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO TEÓRICO	2
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	3
1.1. Enunciado del Problema	3
1.2. Descripción del Problema	3
1.2.1. Área del conocimiento.....	4
1.2.2. Análisis de Variables	5
1.3. Operacionalización de Variables	5
1.4. Interrogantes básicas.....	8
1.5. Tipo de investigación:.....	9
1.6. Diseño de investigación:.....	9
1.7. Nivel de investigación:	9
1.8. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.....	9
1.8.1. Justificación científica:	9
1.8.2. Justificación social:	9
1.8.3. Justificación económica:.....	9
1.8.4. Justificación personal	10
2. MARCO CONCEPTUAL.....	10
2.1. Automedicación:.....	10
2.1.1. Epidemiología de automedicación:	11
2.1.2. Automedicación en el Perú:.....	11
2.1.3. Algunos fármacos y/o sustancias utilizadas en la automedicación durante COVID 19:	12
2.1.4. Peligros de la automedicación	14
2.2. Pandemia:.....	16
	viii

2.3.	Clasificación clínica de severidad COVID 19	16
2.4.	Nivel de saturación de oxígeno (3000msnm)	17
2.5.	Atención primaria y COVID 19:	17
3.	ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS	19
3.1.	A nivel local	19
3.2.	A nivel nacional	20
3.3.	A nivel internacional.....	24
4.	OBJETIVOS.....	27
4.1.	General:.....	27
4.2.	Específicos:.....	27
5.	HIPÓTESIS	28
CAPITULO II PLANTEAMIENTO OPERACIONAL		29
1.	Técnicas, instrumentos y materiales de verificación.....	30
1.1.	Técnica:.....	30
1.2.	Instrumentos:	30
1.3.	Materiales:	31
2.	Campo de verificación	31
2.1.	Ubicación espacial:	31
2.2.	Ubicación temporal:.....	31
2.3.	Unidades de estudio:	32
2.3.1.	Población:	32
2.3.2.	Criterios de selección.....	33
3.	Estrategia de Recolección de datos	33
3.1.	Organización	33
3.1.1.	Recursos	33
3.2.	Validación de instrumentos	33
3.3.	Criterios para manejo de resultados.....	34

3.3.1. Plan de Procesamiento:.....	34
3.3.2. Plan de Codificación:	34
3.3.3. Estrategia de Análisis:	34
CAPÍTULO III RESULTADOS	35
DISCUSIÓN	64
CONCLUSIONES.....	69
RECOMENDACIONES	71
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	72
ANEXOS.....	80



ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1	FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: PRÁCTICA DE AUTOMEDICACIÓN DURANTE ENFERMEDAD COVID 19	36
TABLA 2	FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y GÉNERO DE PACIENTES COVID 19.	38
TABLA 3	FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y EDAD DE PACIENTES COVID 19.	39
TABLA 4	FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y GRADO DE INSTRUCCIÓN DE PACIENTES COVID 19.	41
TABLA 5	FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y OCUPACIÓN DE PACIENTES COVID 19.	42
TABLA 6	FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES COVID 19.	43
TABLA 7	FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y TIPO DE PRUEBA DE PACIENTES COVID 19.	44
TABLA 8	FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE	

SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y COMORBILIDADES DE PACIENTES COVID 19.....	45
TABLA 9 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: COMORBILIDADES PRESENTES EN PACIENTES COVID 19.	46
TABLA 10 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y SATURACIÓN DE O ₂ DE PACIENTES COVID 19.....	48
TABLA 11 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y SEVERIDAD DE PACIENTES COVID 19.....	49
TABLA 12 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE O ₂ DE PACIENTES COVID 19.....	50
TABLA 13 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE PACIENTES COVID 19.....	51
TABLA 14 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON IVERMECTINA EN PACIENTES COVID 19.	52
TABLA 15 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON DIÓXIDO DE CLORO EN PACIENTES COVID 19.....	54

TABLA 16 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON AZITROMICINA EN PACIENTES COVID 19.	56
TABLA 17 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON CEFTRIAXONA EN PACIENTES COVID 19.	57
TABLA 18 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON PARACETAMOL EN PACIENTES COVID 19.	58
TABLA 19 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES EN PACIENTES COVID 19.	60
TABLA 20 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN DE DEXAMETASONA EN PACIENTES COVID 19.	62
TABLA 21 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: FUENTES Y/O AGENTES QUE CONTRIBUYEN CON LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19....	63

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: PRÁCTICA DE AUTOMEDICACIÓN DURANTE ENFERMEDAD COVID 19	36
GRÁFICO 2 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y EDAD DE PACIENTES COVID 19.	40
GRÁFICO 3 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: COMORBILIDADES PRESENTES EN PACIENTES COVID 19.	47
GRÁFICO 4 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON IVERMECTINA EN PACIENTES COVID 19.....	53
GRÁFICO 5 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON DIÓXIDO DE CLORO EN PACIENTES COVID 19.....	55
GRÁFICO 6 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON PARACETAMOL EN PACIENTES COVID 19.	59
GRÁFICO 7 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE	

AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN DE PLANTAS
MEDICINALES EN PACIENTES COVID 19. 61

GRÁFICO 8 FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA
AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE
SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: FUENTES Y/O AGENTES
QUE CONTRIBUYEN CON LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19. ... 63



INTRODUCCIÓN

El tema a tratar en el presente trabajo surgió por la necesidad de conocer la relación de los factores determinantes de la automedicación en la población bajo la coyuntura sanitaria del COVID 19.

Se conoce desde hace mucho que un gran porcentaje de la población hace uso incorrecto de los medicamentos, tal situación unida al temor de la población en estrecha relación con la desinformación (Fake news) promovida por los medios de comunicación y redes sociales sobre el COVID 19 y la promoción de uso de medicamentos sin evidencia científica para esta enfermedad e incluso el consumo de sustancias como dióxido de cloro o medicamentos de uso veterinario.

Además de la difusión de información temprana y con muchas limitaciones de algunos estudios clínicos (1), o in vitro de medicamentos como hidroxiclороquina, azitromicina e ivermectina (2), propiciaron su incorporación cuestionable en los esquemas de tratamiento sugeridos por el MINSA como la distribución y uso del KIT COVID que incluía ivermectina, hidroxiclороquina, azitromicina y paracetamol, que realizó el gobierno a través del Ministerio de Salud (3).

Así mismo la saturación de los establecimientos de salud públicos contribuyeron a la búsqueda masiva de estos medicamentos en establecimientos farmacéuticos, inclusive con la idea errónea de que su consumo podría prevenir la COVID-19. Como consecuencia, se produjo el desabastecimiento en algunos establecimientos públicos y el incremento desmedido de precios en establecimientos privados, todo este panorama se refleja en los resultados de nuestro estudio (4).



CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO TEÓRICO

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Enunciado del Problema

¿Cuáles son los factores determinantes que se relacionan con la automedicación en pacientes COVID 19, atendidos en el Centro de Salud Mariano Melgar Arequipa, 2020 - 2021?

1.2. Descripción del Problema

La automedicación es una práctica frecuente en el mundo, y se define como “el consumo de los medicamentos sin intervención alguna del médico u otro profesional autorizado para prescribir”. Actualmente no es posible eliminar la automedicación, ya que al menos en la mayoría de hogares, una gran parte de las enfermedades que aparecen en la vida de las personas, son manejadas, al menos inicialmente, con algunas técnicas o medicamentos que la propia familia conoce o esencialmente que tiene a su alcance, en este contexto, quizá ahora debería definirse la automedicación como “la voluntad y la capacidad de las personas para participar de manera inteligente y autónoma (es decir, informada) en las decisiones y en la gestión de las actividades preventivas, diagnósticas y terapéuticas que les atañen” (6).

En todo caso en nuestra opinión personal la definición de automedicación responsable en nuestro contexto no solo atañe a la persona que adquiere el medicamento para tratar su dolencia sino a todos los que están involucrados en el proceso desde la producción, importación, distribución, comercialización, promoción, publicidad, dispensación y expendio de productos farmacéuticos y afines (1).

Ya que es sabido que prima la informalidad dentro de todo este proceso. Además de la ya conocida poca adherencia de los pacientes hacia los tratamientos farmacológicos. Por lo cual el empleo del término de automedicación responsable como tal, aún no podría aplicarse ni ejercerse en nuestro medio.

“Son muchos los factores que influyen en la automedicación: a) sociales: como la presión de familiares o amigos que ofrecen una alternativa al problema de salud, basado en su propia experiencia. b) Económicos, como el desempleo y el bajo ingreso económico familiar que no permite acceder a los servicios de salud y por lo tanto la falta de una prescripción médica, alto costo de los medicamentos, etc. c)

Culturales, como la falta de información en la población sobre el uso y riesgos de los medicamentos, así como la insuficiente educación sanitaria en la población. Las consecuencias de la automedicación son diversas, por ejemplo: el incremento en el riesgo de reacciones adversas, el aumento de la resistencia bacteriana, el aumento de los costos en salud, son solo algunas de ellas, que suceden con diferentes medicamentos tan importantes como los antibióticos, que lamentablemente, junto con los AINES son los grupos de medicamentos que presentan mayor prevalencia de automedicación” (5).

“En el Perú, actualmente la automedicación es una práctica muy presente en nuestra sociedad, con una prevalencia que va entre el 40% y 50%. Algunos estudios han señalado algunos factores asociados a su práctica, así Llanos L. desarrolló un estudio sobre automedicación en la ciudad de Cajamarca y encontró que esta se registra con mayor frecuencia en personas pobres de zonas rurales que tienen un ingreso alrededor de 300 nuevos soles. Tello S. y Yovera A. encontraron que el 38,65 % de la población automedicada fueron influenciados por los medios de comunicación para hacerlo, otro hallazgo importante es que el personal de farmacia fue quien sugirió la compra de un medicamento a más de la mitad de las personas que se automedican (50,92%). Si bien es cierto que estos resultados solo muestran los hallazgos de estudios muy puntuales y es conocido la presencia de la automedicación en nuestra sociedad, es necesario conocer con más detalle sus condicionantes, envergadura, etc. especialmente a nivel local y nacional, a fin de establecer medidas efectivas que no colisionen directamente con el acceso a medicamentos por la población, por ejemplo, tener una afianzada credibilidad y confianza del sistema de salud, a fin de que este pueda brindar el acceso apropiado a los servicios de salud a la población para que resuelvan sus problemas de salud en establecimientos públicos y con la atención debida, y no tengan que recurrir a un automedicación por no tener acceso a una consulta privada, etc” (6).

1.2.1. Área del conocimiento

- a) **Área general:** Ciencias de la Salud
- b) **Área específica:** Medicina Humana
- c) **Especialidad:** Salud Pública
- d) **Línea:** Automedicación

1.3. Análisis de Variables

1.3.1. Operacionalización de Variables

Características sociodemográficas

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD/CATEGORÍA	ESCALA
Género	Características secundarias según paciente	Varón/Mujer	Cualitativa
Edad	Número de años de paciente	Jóvenes 18-29 años Adultos 30-59 años Adultos mayores > igual 60 años	Cuantitativa
Grado de instrucción	Nivel de instrucción alcanzado	Analfabeto Primaria completa o incompleta Secundaria incompleta Secundaria completa Técnico superior Superior universitario	Cualitativa
Ocupación	Situación Laboral del paciente	Estudiante, Trabajo dependiente: trabajadores de otros ministerios excepto ministerio de salud Trabajo independiente: taxista, comerciante, conductor, construcción, visitador médico, etc. Ama de casa Personal de salud: nutricionista, odontólogo, enfermero, etc. Jubilados	Cualitativa

Características de la enfermedad

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD/CATEGORÍA	ESCALA
Estado nutricional	Diagnóstico según IMC	Obesidad Sobrepeso Normopeso Bajo peso	Cualitativa
Comorbilidades	Enfermedades diferentes al COVID 19	Diabetes Mellitus Enfermedad cardiovascular: Arritmias, soplos, ACV, Aterosclerosis, Bradicardias, Taquicardias. Hipertensión Arterial Obesidad (IMC ≥ 30) Hepatopatía crónica Enfermedad Renal Neoplasias Asma, fibrosis quística, EPOC, TBC Inmunosupresión Ninguna comorbilidad Otros	Cualitativa
Severidad	Clasificación de la gravedad de la enfermedad COVID 19	Leve Moderada Severa	Cualitativa
Saturación de O ₂	Estado de saturación de oxígeno en Arequipa	88 - 96% (Normal) 84 - 87% (hipoxia leve) 80 - 83 (Hipoxia moderada) < de 79% (Hipoxia severa)	Cuantitativa
Requerimiento de O ₂	Uso de oxígeno medicinal	Sí No	Cualitativa
Evolución	Estado del paciente post atención médica	Alta Estacionaria Fallecido Se trasladó a un centro de mayor complejidad	Cualitativa
Tipo de prueba	Prueba utilizada para diagnóstico	Rápida, Molecular	Cuantitativa

Características de la automedicación

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD/CATEGORÍA	ESCALA
Prácticas de automedicación durante enfermedad COVID 19	Actitud del paciente frente al consumo de medicamentos y/o sustancias	Si se automedicó Si se automedicó exclusivamente plantas medicinales No se automedicó	Cualitativa
Recomendación de automedicación	Fuente y/o agente que propician e impulsan la automedicación de medicamentos y/o sustancias	La indicó un familiar Yo solo elegí tomarla La indicó un vecino y/o amigos La conoció en redes y/o medios de comunicación No tomo esta medicina Otro: personal de salud no médico.	Cualitativa
Sustancias o medicamentos utilizados en automedicación	Aprobadas por FDA	Antibióticos Antinflamatorios Corticoides Ivermectina	Cualitativa
	No aprobadas por FDA	Dióxido de Cloro Ivermectina de uso veterinario Plantas Medicinales Otros	Cualitativa

1.4. Interrogantes básicas

¿Cuáles son los factores determinantes relacionados a la automedicación en pacientes COVID 19 atendidos en el Centro de Salud "Mariano Melgar" Arequipa?

¿Cuáles son las características de la automedicación y su relación con la realización de la automedicación de los pacientes COVID 19 que acudieron al Centro de Salud "Mariano Melgar" Arequipa?

¿Cuál es la actitud de los pacientes del Centro de Salud "Mariano Melgar" frente a la práctica de automedicación?

¿Cuáles son las fuentes y/o agentes que propician e impulsan la práctica de automedicación en pacientes con el diagnóstico de COVID 19?

¿Cuáles fueron los fármacos aprobados por la FDA empleados para la automedicación en pacientes COVID 19 del Centro de Salud "Mariano Melgar" Arequipa?

¿Qué otras sustancias y/o medicamentos no aprobados por la FDA fueron empleados para la automedicación de pacientes COVID 19 del Centro de Salud "Mariano Melgar" Arequipa.?

¿Cuáles son las características sociodemográficas y su relación con la práctica de automedicación de los pacientes COVID 19 que acudieron al Centro de Salud "Mariano Melgar" Arequipa?

¿Cuáles son las características de la enfermedad de los pacientes COVID 19 y su relación con la práctica de automedicación que acudieron al Centro de Salud "Mariano Melgar" Arequipa?

¿Cuál es la relación entre las comorbilidades y la práctica de automedicación de pacientes que acudieron al Centro de Salud "Mariano Melgar" Arequipa?

¿Cuál es la relación de los aspectos clínicos de la enfermedad con la práctica de automedicación de pacientes COVID 19 que acudieron al Centro de Salud "Mariano Melgar" Arequipa?

1.5. Tipo de investigación:

No experimental porque no se manipulará a la población.

1.6. Diseño de investigación:

Transversal: porque la toma de datos será en una sola oportunidad.

1.7. Nivel de investigación:

La presente investigación es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, relacional y correlacional.

1.8. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.8.1. Justificación científica:

El presente trabajo de investigación busca contribuir al conocimiento de los principales factores que determinan la automedicación y su relación con dicha práctica en el preciso periodo de la pandemia COVID 19, 2020 -2021 de esta manera dar a conocer la relación entre estos, para poder generar estrategias para educar a la población y esta tenga mejor respuesta en situaciones futuras similares.

1.8.2. Justificación social:

La automedicación constituye un problema de salud pública y un desafío para la comunidad médica debido a que se ha convertido en una práctica común que prevalece en países como el nuestro, ya que existe menos control por parte del estado así como menos acceso a sistema de salud, este comportamiento nocivo ha sido facilitado por las nuevas tecnologías de información y promovido por los medios de comunicación; toda esta situación unida al surgimiento de la pandemia del COVID 19 agravó la práctica de la automedicación, poniendo en evidencia que somos una población vulnerable, tornando esta práctica peligrosa, por las diferentes consecuencias que conlleva como reacciones adversas, dependencia, enmascaramiento de procesos clínicos graves, resistencia antimicrobiana, etc.

1.8.3. Justificación económica:

Con el presente estudio en cuanto al aspecto económico si disminuye la práctica de la automedicación, las terapias con fármacos serían más efectivas,

disminuyendo la ocurrencia de complicaciones y por tanto el costo de tratamiento no se vería incrementado (5).

1.8.4. Justificación personal

Esta pandemia reveló una serie de dificultades en diversos ámbitos de la salud, entre ellos la prescripción de medicamentos sin eficacia demostrada contra la infección por SARS-CoV-2 (por parte del sector salud). Consideramos importante la realización de nuestro estudio para identificar los principales factores a intervenir en la población en aras de mitigar la automedicación, así como los efectos adversos que conlleva esta práctica. Del mismo modo, mantener una conducta vigilante sobre los profesionales de la salud que hacen promoción, en los medios de comunicación, del uso de medicamentos sin evidencia científica. Así como, cooperar con la realización y fortalecimiento de estrategias educativas que nos ayuden a lograr disminuir esta práctica como lo han venido sugiriendo diversos estudios (6).

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. Automedicación:

La OMS define a la automedicación como: “La selección y uso de los medicamentos por parte de las personas sin prescripción médica, con el propósito de tratar enfermedades o síntomas que ellos mismos pueden identificar” (7). En su Reporte de la 4° reunión del grupo consultivo de la OMS sobre el papel del farmacéutico de 1998 define el término Automedicación responsable como “Una práctica mediante la cual las personas tratan sus dolencias y afecciones con el uso de medicamentos autorizados, disponibles sin necesidad de prescripción, y que son seguros y eficaces si se los emplean según las indicaciones” (8), aunque este término fue definido desde 1978 en la declaración de ALMA ATA. En el 2006 Ramírez Puerta et al en su artículo titulado: La automedicación responsable, la publicidad farmacéutica y su marco en la Atención Primaria refiere que “La Organización Mundial de la Salud (OMS) ve en la automedicación responsable una fórmula válida de atención a la salud en las sociedades desarrolladas” (9). Para ello se dispone de medicamentos clasificados como especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP) estos son fármacos enfocados al tratamiento de patologías

banales o de síntomas menores, que son las únicas de las que puede hacerse publicidad dirigida a la población, siempre bajo un control previo” (10).

2.1.1. Epidemiología de automedicación:

En los diferentes estudios publicados en la literatura se han explorado factores de riesgo asociados a la práctica de automedicación. Aunque los resultados son muy diversos, en general se ha encontrado una mayor prevalencia de este fenómeno en mujeres, estudiantes universitarios, personas que viven solas y pensionados, así como en personas de estratos socioeconómicos bajos, iletrados o con bajo nivel educativo se automedican (11).

Según la DIGEMID, en sus últimos boletines 2006 y 2008 sobre automedicación refiere que “En el Perú, la automedicación es una práctica muy presente en nuestra sociedad, con una prevalencia que va entre el 40% y 50%. Algunos estudios han señalado algunos factores asociados a su práctica, así Llanos L. desarrolló un estudio sobre automedicación en la ciudad de Cajamarca y encontró que esta se registra con mayor frecuencia en personas pobres de zonas rurales que tienen un ingreso alrededor de 300 nuevos soles. Tello S. y Yovera A. encontraron que el 38,65 % de la población automedicada fueron influenciados por los medios de comunicación para hacerlo, otro hallazgo importante es que el personal de farmacia fue quien sugirió la compra de un medicamento a más de la mitad de las personas que se automedican (50,92%)”(6).

2.1.2. Automedicación en el Perú:

En la Ley General de Salud, artículo 26°, se indica lo siguiente: "Solo los médicos, pueden prescribir medicamentos, los cirujanos dentistas y las obstetrices podrán prescribir dentro del área de su profesión". Y en el artículo 33° indica que: “El químico-farmacéutico es responsable de la dispensación y de la información y orientación al usuario sobre la administración, uso y dosis del producto farmacéutico, su interacción con otros medicamentos, sus reacciones adversas y sus condiciones de conservación ” (12).

" Factores que contribuyen al uso incorrecto de los medicamentos:

- Falta de educación.

- Falta de conocimientos de la enfermedad y de sus posibles tratamientos y vacunas.
- Ausencia de terapias efectivas.
- Dudas sobre el diagnóstico.
- Promoción de los medicamentos en forma inapropiada y contraria a la ética por parte de las empresas farmacéuticas
- Beneficios de la venta de medicamentos
- Disponibilidad de medicamentos sin restricciones
- Sobrecarga de trabajo del personal sanitario
- Medicamentos inaccesibles.

Por lo tanto constituye un problema importante de salud pública que requiere constantes evaluaciones en el ámbito comunitario "(13).

2.1.3. Algunos fármacos y/o sustancias utilizadas en la automedicación durante COVID 19:

2.1.3.1. Azitromicina

"Un estudio no aleatorizado que tuvo gran repercusión mediática al comienzo de la pandemia puso la azitromicina entre los tratamientos más utilizados contra el COVID-19. Sin embargo, se trata de un antibiótico usado frecuentemente en enfermedades causadas por bacterias, mientras que el COVID-19 es una infección viral. La azitromicina se propuso para prevenir el COVID-19, pero también se postuló como tratamiento contra la enfermedad en diferentes etapas. Las teorías que justificarían su uso como terapia para el COVID-19 no están del todo probadas. La publicación de los resultados del ensayo RECOVERY, basado en datos de más de 7 mil pacientes, no hizo más que confirmar lo que ya sabíamos gracias a otros ensayos: Azitromicina no tiene ningún beneficio en el tratamiento de COVID-19" (14).

2.1.3.2. Hidroxicloroquina y cloroquina

"Al comienzo de la pandemia, un estudio no aleatorizado que tuvo gran repercusión mediática puso la hidroxicloroquina y la cloroquina entre los tratamientos más utilizados contra el COVID-19. La recomendación de utilizarla que hizo una guía china (sin haber publicado los datos que la

sustentaban) y la promoción realizada por los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro (sin base científica) también contribuyeron a su popularidad. Se propusieron para prácticamente todo el espectro de casos posibles, tanto de prevención como de tratamiento del COVID-19. La evidencia sobre el rol de la cloroquina y la hidroxicloroquina en el tratamiento del COVID-19 es categórica: no son efectivos. Se trata de evidencia que proviene de más de 40 ensayos que ya han reportado datos de más de 15 mil pacientes. En cuanto al rol de estos fármacos en la prevención del COVID-19, la evidencia también es desalentadora. Todos los ensayos aleatorizados sobre prevención con los que contamos han reportado que no se observó ningún efecto beneficioso. A pesar de ello, a principios de octubre se reactivó la controversia cuando dos grupos de investigadores afirmaron que al combinar todos estos estudios sí se observaría un beneficio. Lamentablemente, estas afirmaciones están basadas en revisiones muy poco rigurosas de los datos. Lo más razonable es ignorarlas hasta que contemos con los análisis más completos, que estarán disponibles muy pronto. El 17 de diciembre la OMS publicó la recomendación de no utilizar hidroxicloroquina o cloroquina en pacientes con COVID-19, cualquiera sea la severidad de la enfermedad" (14).

2.1.3.3. Dióxido de Cloro

"No se ha planteado su uso para ningún tipo de pacientes, pero se ha extendido la falsa noticia de que podría prevenir el contagio del COVID-19. Tampoco se han iniciado investigaciones sobre este producto. Probablemente el dióxido de cloro nunca será evaluado en estudios clínicos porque existe información suficiente que advierte de sus riesgos para la salud. Más aún, no hay investigación de laboratorio o de ningún otro tipo que haga suponer que tendría un beneficio. Se trata más bien de un caso típico de "terapia" cuyo estatus no responde a razones científicas" (14).

2.1.3.4. Ivermectina

"La ivermectina es un antiparasitario con efectos probados en animales y seres humanos en el tratamiento contra algunos parásitos intestinales o externos, como la pediculosis. La ivermectina se está investigando tanto para la prevención como para el tratamiento de COVID-19 en etapas

iniciales. La cantidad de ensayos evaluando ivermectina para la prevención o el tratamiento de COVID-19 sigue aumentando. Varios de ellos han anunciado sus resultados como positivos, pero se trata de ensayos con limitaciones importantes. Al analizar toda la información publicada, la principal conclusión es que la evidencia es de muy baja certeza, por lo que no es posible concluir si se trata de un fármaco efectivo o no. Más aún, el 30 de diciembre del 2021 se anunció en conferencia de prensa que el ensayo EPIC, uno de los mayores realizados hasta ahora, no observó beneficio alguno. Desafortunadamente, a pesar del interés creciente en este fármaco, todavía no es posible aventurar si la ivermectina será efectiva o no, por lo que sigue en la categoría "neutro" en nuestro ranking" (14).

2.1.4. Peligros de la automedicación

"La automedicación se ha convertido en un comportamiento masivo a nivel global, facilitado por la publicidad y las nuevas tecnologías de información y comunicación. La información restringida sobre medicamentos y tratamientos, que no era accesible en otros tiempos para el público y que estaba limitada al cuerpo médico y de profesionales de la salud, ahora está completamente disponible. Incluso es posible, a través de los nuevos medios, la obtención directa de "recetas médicas" y hasta de medicamentos de control. La práctica de automedicación es especialmente prevalente en países en vías de desarrollo y en poblaciones vulnerables, donde existe menos acceso a sistemas de salud y menos control por parte del Estado" (10).

"El concepto de automedicación también ha evolucionado, y actualmente se reconocen consistentemente en la literatura dos grandes variantes: la automedicación responsable relacionada con el autocuidado, es decir, la iniciativa de la persona de cuidar su propia salud; y la automedicación no responsable, que es una desviación de la terapia farmacológica con todas sus implicaciones y consecuencias. A diferencia de la automedicación, el autocuidado y los términos relacionados se refieren a procesos de largo plazo, que involucran estilos de vida saludables asociados con prácticas de promoción y prevención de la salud general" (11).

"La forma como se relacionan los múltiples términos asociados con preparaciones farmacéuticas y medicamentos con la automedicación tiene que

ver con su clasificación básica como medicamentos de prescripción o de no prescripción. Dentro de esta última categoría, en la literatura se identifican tres subclases: OTC, BTC y UTC, de acuerdo con la forma de acceder al medicamento por parte del usuario. Finalmente, la automedicación no necesariamente descarta la prescripción médica, ya que es posible que el paciente se desvíe de la misma de diversas formas: sobre-medicándose, sub-medicándose, interrumpiendo o prolongando el tratamiento prescrito" (12).

"No existe medicamento inocuo. Todos los medicamentos sin excepción, empleados en dosis excesivas o durante períodos demasiado prolongados, en situaciones en que no estarían indicados, pueden producir efectos secundarios, indeseables o adversos, generar interacciones con otros fármacos o sustancias, inducir conductas de abuso o dependencia e incluso retrasar el diagnóstico de una afección que requiera cuidados médicos. Existe una preferencia en el consumir un fármaco antes de adoptar conductas que nos ayuden a prevenir su utilización, lo cual implica todo un desafío. Optimizar el uso de medicamentos impactaría en la reducción de gastos en salud pública pero para ello se requiere de la participación consciente y activa de los diferentes eslabones de la cadena del medicamento: el productor, el prescriptor, el dispensador, y el consumidor" (15).

"La automedicación compromete una serie de riesgos para la salud que en muchos casos son desconocidos por los ciudadanos. Conlleva riesgos implícitos como reacciones adversas y en algunos casos intoxicación. Una característica importante de la automedicación es su falta de efectividad, ya que los usuarios que la realizan consumen medicamentos para circunstancias en las que no están indicadas (uso de antibióticos durante procesos virales). Otros efectos descritos son la dependencia, enmascaramiento de procesos clínicos graves, interacciones con otro medicamento, sinergismo o antagonismo en el efecto del medicamento" (16).

"Las reacciones adversas de los medicamentos figuran entre las diez causas principales de defunción en todo el mundo. Se estima que en USA 4,7% del total de hospitalizaciones anuales (aproximadamente 1 millón de pacientes) son debidas a efectos adversos a medicamentos. Por otra parte, aproximadamente

100000 muertes al año serían atribuibles a efectos adversos a medicamentos" (17).

2.2. Pandemia:

"Etimológicamente el vocablo pandemia procede de la expresión griega pandêmonnosêma, traducida como "enfermedad del pueblo entero". A primera vista parece hacer referencia a elementos claros, unánimes y continuos en el tiempo que no merecen discusión. Sin embargo, al hacer una aproximación a los momentos históricos que han suscitado el uso de tal expresión, es posible percibir que se trata de una construcción social que se transforma en el tiempo y en la que participan, en permanente tensión, diferentes corrientes de pensamiento" (17).

"Es una enfermedad que se extiende a muchos países y continentes, traspasa gran número de fronteras, supera el número de casos esperados y persiste en el tiempo; además, ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que para que pueda aparecer una pandemia se necesita:

- Que aparezca un virus nuevo, que no haya circulado previamente y por lo tanto, no exista población inmune a él.
- Que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad.
- Que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz" (19).

2.3. Clasificación clínica de severidad COVID 19

- Leve: (tratamiento domiciliario) Tos, Malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal.
- Moderado: (paciente hospitalizada) disnea o dificultad respiratoria, $FR > 22$ respiraciones /minuto, Alteración de conciencia (desorientación, confusión), hipertensión arterial o shock, signos clínicos o radiológicos de neumonía, Recuento de linfocitos < 100 células/uL.
- Severo: (paciente hospitalizado en unidades críticas) $FR > 22$ respiraciones /minuto o $PaCO_2 < 32$ mmHg. Alteración de conciencia, PA sistólica < 100 mmHg o RAM < 65 mmHg, $PaO_2 < 60$ mmHg o $PaFi < 300$, Signos clínicos de fatiga muscular: aleteo nasal, uso de músculos accesorios, desbalance toraco-abdominal, Lactato sérico > 2 mosm/L (19).

2.4. Nivel de saturación de oxígeno (3000msnm)


- Normal 88-96%
- Hipoxia leve: 84-87%
- Hipoxia moderada: 80-83%
- Hipoxia severa: <79% (19).

2.5. Atención primaria y COVID 19:

"La APS juega hoy un papel fundamental en la prevención y control de la pandemia por Covid-19, y en la atención de los pacientes infectados. Ese potencial de la APS para contribuir en la prevención, control y atención de pacientes con Covid-19, se ha mostrado en países como China y Cuba, que hoy tienen resultados sobresalientes. En la República Popular de China, desde el primer nivel de atención, los profesionales de APS realizan el pre-test y triaje de pacientes y remiten los infectados con una persona designada a instituciones designadas. Hacen visitas puerta a puerta en búsqueda y seguimiento de sospechosos y rastreo de contactos, sin entrar en los domicilios; promueven medidas educativas, de aislamiento y cuarentenamiento, y prescriben tratamientos a pacientes con enfermedades crónicas. Hacen seguimiento diario de personas aisladas a través del control de temperatura, la vigilancia de síntomas y el cumplimiento de las prescripciones; compilan, analizan e intercambian información con otros profesionales y los gestores sanitarios para la planeación de acciones y la educación; desarrollan procedimientos como el Card spot screening mediante la investigación de la historia de la epidemia y de los contactos en lugares determinados, la toma de temperatura en puntos definidos de control, entre otros; identifican personas que necesitan aislamiento; hacen entrenamiento de voluntarios para que apoyen la toma de temperatura y usen otros apoyos tecnológicos; manejan poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como adultos mayores, con enfermedades crónicas, en situación de discapacidad y migrantes, entre otros" (20).

"En la República de Cuba, la búsqueda activa de personas con sintomatología de infección respiratoria aguda y sus contactos se hace de modo geo-referenciado en los domicilios y las instituciones a través de los servicios de atención primaria comunitaria, y mediante aplicaciones virtuales de libre uso ciudadano o portados

por el personal de salud. El equipo de APS define si los pacientes sospechosos se quedan en casa para observación, se envían a sitios de aislamiento de cuidados primarios, o se remiten a más altos niveles de complejidad por riesgos de ser enfermos graves o en estado crítico. En este país no se atienden pacientes confirmados ni sospechosos por la Covid-19 en los domicilios. Los contactos estrechos son sometidos a vigilancia permanente en otros centros de aislamiento designados. Se hacen estudios poblacionales de intervención con PCR en zonas de alto riesgo para conocer la incidencia de asintomáticos. Los pacientes confirmados, sospechosos, asintomáticos y sus contactos no deben acudir a espacios habituales de atención de pacientes con otras patologías" (20).



3. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

3.1. A nivel local

Hasta el momento no se encontraron antecedentes locales en el contexto de pandemia COVID, pero se cuenta con un único trabajo referido a automedicación en general.

Autor: Medina Tejada PA, Trujillo Salas MS

Título: Factor social relacionado con la automedicación de la enfermera en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2016.

"PRIMERA: En relación a la edad el mayor porcentaje de la población está comprendido entre 54 a 63 años y en los otros grupos de edad los porcentajes son aproximados. La población de estudio en su totalidad son mujeres; respecto al estado civil, el 54.6% son casadas y el 30.6% son solteras. En cuanto a su labor el 50% se encuentra en el área de hospitalización, el 31.5% corresponde a áreas críticas y el 18.5% se encuentra en los consultorios externos, mientras que el 60.2% de las enfermeras tiene de 1 a 15 años de servicio; considerando estudios de postgrado la mayor parte a seguido como mínimo una especialidad 83.3%, el 4.6% tienen grado Académico Magister en Enfermería. SEGUNDA: En cuanto a las características de la automedicación el instrumento estudio los indicadores de: Tipo de prescripción, Manejo de la información, Influencia del medicamento, Adherencia terapéutica, abordando esto en conjunto y de forma integral dando como resultado la diferenciación de la Automedicación en Práctica No Responsable con un porcentaje de 31.5 % y en Práctica Responsable el 68,5 % de Enfermeras. TERCERA: Considerando los Factores Académicos, existe una relación significativa en el Grado Académico y la Práctica de Automedicación, pudiendo deducir que las Enfermeras con mayor grado académico desarrollan una Automedicación Responsable, en comparación con las Enfermeras que solo tienen el grado académico de Bachiller" (21).

3.2. A nivel nacional

Autor: Hermoza-Moquillaza, Rocío

Título: "Automedicación en un distrito de Lima Metropolitana, Perú."

“La automedicación es una práctica de riesgo cuyas consecuencias incluyen el enmascaramiento de la enfermedad, las reacciones adversas, interacciones de medicamentos, el aumento de la resistencia a ciertos tipos de drogas y las drogodependencias. Objetivos: Determinar la frecuencia de automedicación en los consumidores de medicamentos que acuden a los establecimientos farmacéuticos de un distrito de Lima Metropolitana y las variaciones de las tasas según edad, sexo y grado de instrucción. Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal, aplicando una encuesta durante los meses de septiembre a noviembre de 2013. La selección de la población fue por muestreo sistemático. Participaron 406 usuarios de establecimientos farmacéuticos del distrito de Pueblo Libre. Resultados: La frecuencia de automedicación en el distrito de Pueblo Libre fue 56,65% (IC 95% 0,4985 – 0,6302). El 36,09% fue en jóvenes de 18 a 24 años, el 51,30% fue de sexo masculino y el 58,70% tenía nivel de estudio básico (primario y secundario). Los tipos de automedicación más frecuentes fue la sugerida por el propio usuario en un 49,13% y la sugerida por los familiares en un 21,74%. El síndrome doloroso fue la causa más importante de automedicación en 40,35% y los tipos de fármacos más adquiridos fueron los AINE 30%, los antigripales 20,87%, medicamentos gastrointestinales 15,22%, los analgésicos 8,67%, los antialérgicos 7,39% y los antibióticos 4,35%. Conclusiones: La automedicación en los consumidores de medicamentos que acuden a los establecimientos farmacéuticos fue alta” (16).

Autor: Ayamamani Quispe. GW

Título: Principales características y factores asociados a la automedicación de un centro de salud en la Región Callao

"Se efectuó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, realizado en el centro médico municipal de Bellavista - Callao. Febrero 2020. Muestra: n=255. Resultados: Se halló una prevalencia de 58,43% pacientes que se automedican. El grupo etario con mayor prevalencia en automedicación fueron adultos de 30 a 59 años con un 60,4%. El 58,4% fue de sexo femenino, un 71,8% son independientes y el 55,7% cuentan con un seguro de salud. El síntoma con mayor frecuencia de automedicación fue el dolor con 38,26% y el grupo de fármacos de mayor demanda, los antiinflamatorios con 38,26%. Las causas más importantes fueron la recomendación por terceros, la falta de tiempo y no exigir receta al momento de la compra. El único factor asociado fue la variable ocupación con un OR: 2,27. Conclusiones: La prevalencia de la automedicación es alta, es mayor en mujeres, con independencia y que tienen un seguro de salud. Los conocimientos sobre los efectos adversos de los medicamentos son escasos. La causa más frecuente fue la recomendación de un tercero. Palabras clave: Automedicación, características, factores "(22).

Autor: Miñan-Tapia, Armando

Título: "Factores asociados a la automedicación con fármacos relacionados a COVID-19 en estudiantes de ciencias de la salud de una ciudad peruana"

"Objetivos: Determinar los factores asociados a la automedicación con fármacos relacionados a COVID-19 en estudiantes de ciencias de la salud. Material y métodos: Estudio observacional, analítico transversal, en estudiantes de ciencias de la salud de Tacna-Perú. Mediante un cuestionario virtual se recolectaron variables socio- educativas, prácticas, características de automedicación y exposición a COVID-19. El outcome fue haberse automedicado en los últimos 3 meses con al menos 1 de 14 fármacos. Se calcularon las razones de prevalencia mediante los modelos lineales generalizados. Resultados: De los 718 estudiantes, el 51,3% se había automedicado. 62,2% se automedicó por presentar dos o más síntomas respiratorios siendo los fármacos más utilizados los antipiréticos, analgésicos y corticoides. Tuvieron mayor frecuencia de automedicación los estudiantes con

pareja sentimental (RP: 1,33; IC95%:1,16-1,53), de una universidad particular (RP: 1,36; IC95%: 1,10-1,69), que sus padres o familiares se automediquen algunas veces o siempre (RP: 2,34; IC95%:1,58–3,47) y en los que se realizaron una prueba de tamizaje para COVID-19 (RP: 1,47; IC95%: 1,14–1,89). Conclusiones: Encontramos una alta prevalencia de automedicación. Tuvieron mayor frecuencia de automedicación quienes tenían una pareja sentimental, procedentes de una universidad particular, que sus padres o familiares se automediquen y en quienes se realizaron una prueba de tamizaje para COVID -19, lo cual podría ser utilizado para promover el uso racional de medicamentos” (23).

Autor: Lescano, Jesús, and Chris Pinto.

Título: "Ivermectina dentro del protocolo de tratamiento para la COVID-19 en Perú: Uso sin evidencia científica"

“Ivermectina es uno de los fármacos antiparasitarios más ampliamente utilizados en medicina veterinaria. Asimismo, en medicina humana es utilizada en el tratamiento de diversas parasitosis. Sin embargo, su uso masivo sin control viene siendo asociado a la presentación de resistencia parasitaria. La emergencia del SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, ha desafiado a los sistemas de salud a nivel mundial, forzándolos a trabajar urgentemente en el desarrollo de protocolos de tratamiento adecuados para dicha enfermedad. En el Perú, el Ministerio de Salud dispuso la inclusión de ivermectina dentro del protocolo de tratamiento contra la COVID-19. Con el objetivo de conocer la evidencia científica que respalda dicha medida, se realizó una búsqueda sistemática en repositorios digitales de revistas científicas y en las bases de datos de ensayos clínicos enfocados en tratamientos contra la COVID-19. Hasta la fecha de remisión de este artículo, no se encontró evidencia científica que respalde la eficacia ni seguridad del uso de ivermectina como tratamiento contra el SARS-CoV-2 en seres humanos. El único indicio es un estudio in vitro, cuya replicación en pacientes sería poco probable debido a que se necesitarían usar dosis considerablemente más altas que aquellas actualmente aprobadas para consumo humano. Adicionalmente, se encontró registro de algunos ensayos clínicos evaluando la inclusión de ivermectina en pacientes COVID-19, cuyos resultados aún no han sido publicados. Finalmente, este artículo describe

tanto las consecuencias que podrían tener la desinformación generalizada respecto a ivermectina como tratamiento contra la COVID-19 sumada a la permisibilidad de que productos veterinarios conteniendo dicho principio activo sean empleados en pacientes humanos, así como, el importante rol de los Médicos Veterinarios en esta situación” (24).

Autor: Zavala-Flores, Ernesto, and Jannin Salcedo-Matienzo

Título: “Medicación prehospitolaria en pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital público de Lima-Perú”

"Se estudiaron pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 (confirmado o sospechoso), en el Hospital Cayetano Heredia, en Lima, durante la tercera semana del mes de junio del 2020 (del 14 al 21 de junio). Se incluyeron pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 (confirmados o sospechosos) mayores de 18 años. Los criterios de exclusión fueron: pacientes hospitalizados cuyo diagnóstico de COVID-19 fuese un hallazgo laboratorial sin sintomatología respiratoria. De un total de 132 pacientes hospitalizados con una media de edad de 60,3 años. 120 pacientes presentaron diagnóstico confirmado para COVID-19 con prueba rápida y/o prueba molecular (PCR), el sexo masculino fue el predominante (69,7%) con una relación de 2,3 a 1 con respecto al sexo femenino, y la media de tiempo de enfermedad previo a la admisión hospitalaria fue de $8,0 \pm 3,7$ días. 59 pacientes (44,7%) presentaron al menos una comorbilidad; y 19 de ellos, tuvieron dos o más comorbilidades. La más frecuente fue la hipertensión arterial (23,5%), y la dualidad más frecuente, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. 127 pacientes (96,2%) recibieron soporte oxigenatorio; de ellos, 25 estuvieron con vía cánula binasal (18,9%); 92, mascara reservorio (69,7%); y 10, ventilación mecánica invasiva (7,6%). Del total, 106 pacientes (80,3%) usaron fármacos antes de la admisión hospitalaria; de los cuales, 36 (33,9%) se automedicaron. 97 pacientes (91,5%) usaron dos o más medicamentos, siendo los antibióticos los más frecuentes (85,8%), seguido por la ivermectina (66,9%). Dentro del grupo de medicamentos sin prescripción médica, los más frecuentes fueron los antibióticos (28,3%) "(1).

Autor: Pari Olarte, JB et al.

Título: “Factores asociados con la automedicación no responsable en el Perú (2021)”

"Donde se incluyó 3849 usuarios de establecimientos farmacéuticos, el riesgo de automedicación no responsable fue muy alto cuando el dispensador del medicamento no solicitó la receta del usuario, también, se encontró que los menores de 30 años tenían un mayor riesgo de automedicación no responsable en comparación con los adultos mayores. Del mismo modo, los usuarios de sexo masculino y aquellos que no tenían seguro de salud también presentaron un mayor riesgo de automedicación no responsable" (25).

3.3. A nivel internacional

Autor: Reynoso, Hernández O, Guadalupe E

Título: “Prevalencia de la automedicación y del consumo de remedios herbolarios entre los usuarios de un Centro de Salud”

"En la mayoría de los hogares, una gran parte de las enfermedades que aparecen en la vida de las personas son manejadas inicialmente con alguna de las técnicas, medicamentos o remedios que la propia familia conoce o tiene a su alcance para aliviar dichos problemas. La prevalencia de la automedicación en la población en estudio fue de 86.36% y la prevalencia del consumo de remedios herbolarios fue de 40.25%. Los principales medicamentos que utilizó la población para la práctica de la automedicación son los analgésicos (41.87%), las formulaciones para el resfriado común (22.50%) y los antibióticos (9.85%). Los remedios herbolarios más utilizados por la población fueron el té de manzanilla (35.04%) y los jugos o licuados a base de frutas y/o verduras (17.74%). Entre los padecimientos para los cuales se consumieron medicamentos de forma autónoma por el usuario destacan el dolor de cabeza (66.54%), los síntomas gripales (43.98%) y el dolor de estómago (27.81%). Por otro lado, se encontró que el dolor de estómago (53.22%), la tos (16.9%) y el resfriado común (16.9%), son los padecimientos que generan el consumo de remedios herbolarios. La familia es la principal fuente que motiva y recomienda el consumo de medicamentos al usuario (37.96%), seguido de la utilización de la receta previa del médico tratante (25.56%) y la iniciativa propia (22.18%). En lo que respecta a los remedios herbolarios el ámbito familiar es fuente importante de recomendación, pues la familia (47.58%) y la tradición

familiar (28.22%) incentivan su utilización en el usuario. Las principales variables asociadas a la práctica de la automedicación son la edad 25 a 34 años (93.25%), quienes son obreros 96.77% de estado civil soltero (88.78%) y el nivel de escolaridad que varía entre el bachillerato terminado (92.80%), o los estudios superiores completos (92.30%). Por otro lado, las variables asociadas al consumo de remedios herbolaros son edad de 65 o más años (58.33%) mujeres (43.56%), casadas (45.21%), amas de casa (53.44%) y que carecen de estudios a nivel básico (62.50%). La prevalencia de la automedicación en los pacientes con enfermedades crónico degenerativas, específicamente Diabetes mellitus e hipertensión arterial, fue de 77% y la prevalencia del consumo de remedios herbolaros, para este grupo, fue de 50%" (26).

Autor: Román BR, Moscoso S, Chung S ah, Terceros BL, Álvarez-Risco A, Yáñez JA

Título: "Tratamiento de la COVID-19 en Perú y Bolivia y los riesgos de la automedicación"

“Se están utilizando diversos fármacos para la sintomatología que causa la COVID-19 sin que estén aprobados para esos fines. Muchos de estos medicamentos tienen un margen de seguridad pequeño y tienen efectos adversos muy riesgosos para la salud, por lo que requieren de receta médica y, sobre todo, de monitoreo y seguimiento médico. Lamentablemente hay muchos casos de automedicación en Perú y Bolivia que requieren de un pronto abordaje. Objetivo: Efectuar una revisión sistemática de la literatura científica que presenta evidencias sobre la efectividad y las reacciones adversas de los fármacos que se usan en la actualidad contra la COVID-19 en Perú y Bolivia. Métodos: Investigación cualitativa a partir de la revisión sistemática de la literatura científica disponible en PubMed, así como la normativa nacional de Perú y Bolivia relacionada con etiología, epidemiología, sintomatología, los tratamientos aprobados y discontinuados por ambos países desde la agudización de la crisis de la COVID-19 y los estudios clínicos que se han completado hasta la fecha. Conclusiones: Los medicamentos usados en Perú y Bolivia para el tratamiento de la COVID19 tienen efectos secundarios y posibles riesgos a la salud de las personas que lamentablemente se automedican. Se requiere un mayor control de estos medicamentos para evitar su libre adquisición, mejorar la estrategia nacional y regional para evaluar los posibles tratamientos

sintomatológicos de la COVID-19, para lo que se debe tener en cuenta la alta probabilidad de sobrevivencia de la enfermedad y el riesgo que representa el empleo de estos fármacos, lo que podría causar en el futuro serios efectos adversos a la salud pública de los dos países” (27).

Autor: Makowska M, Boguszewki R, Nowakowski M, Podkowińska M.

Título: “Self-Medication-Related Behaviors and Poland's COVID-19 Lockdown”

“Antecedentes: la pandemia del SARS-CoV-2 ha cambiado el funcionamiento de los sistemas de salud polacos. Se ha desarrollado la telemedicina y se ha facilitado el acceso a los medicamentos recetados (Rx). Este estudio examinó si estos cambios y la imposición de un bloqueo de tres meses hicieron que los polacos se involucraran en más conductas relacionadas con la automedicación. Método: Después de la cuarta (última) etapa de descongelación de la economía polaca, se realizó una encuesta en línea de una muestra de cuotas de 1013 encuestados polacos. Resultados: casi la mitad de los encuestados (45,6%) indicaron que habían participado en al menos un comportamiento asociado con la automedicación inapropiada durante el encierro (por ejemplo, el 16,6% tomó medicación como precaución y el 16,8% tomó un Rx formulación sin consulta). Algunas de estas personas nunca se habían involucrado en tales comportamientos antes del cierre. La regresión lineal mostró que los valores más altos de un índice compuesto ("encierro") de conductas relacionadas con la automedicación que ocurrieron durante el encierro fueron predichos por una mayor religiosidad y la presencia de niños en un hogar. Además, muestras independientes Las pruebas t mostraron que las personas que temían por su futuro financiero y las personas que temían por su salud obtuvieron puntuaciones de índice de bloqueo más altas que las personas que no tenían tales preocupaciones. Conclusiones: Los comportamientos relacionados a la automedicación eran más comunes entre los polacos antes del encierro que durante el encierro (lo cual no es sorprendente dado que la duración de los períodos comparados fue enormemente diferente). Es preocupante que muchas personas exhiban tales comportamientos por primera vez. durante el encierro” (28).

4. OBJETIVOS.

4.1. General:

Identificar los factores determinantes relacionados a la automedicación en pacientes COVID 19 atendidos en el Centro de salud "Mariano Melgar" Arequipa, 2020 – 2021


4.2. Específicos:

- Determinar las características de la automedicación y su relación con la práctica de automedicación de los pacientes COVID 19 del Centro de Salud "Mariano Melgar".
- Definir la actitud de los pacientes frente a la automedicación de los pacientes COVID 19 del Centro de Salud "Mariano Melgar".
- Establecer las fuentes y/o agentes que propician e impulsan la actividad de automedicación en pacientes COVID 19 del Centro de Salud "Mariano Melgar".
- Mencionar los fármacos empleados para la automedicación de pacientes COVID 19 del Centro de Salud "Mariano Melgar" Arequipa.
- Establecer que otras sustancias no aprobadas por la FDA fueron empleadas para la automedicación de pacientes COVID 19 del Centro de Salud "Mariano Melgar" Arequipa.
- Relacionar las características sociodemográficas con la práctica de automedicación de los pacientes COVID 19 que acudieron al Centro de Salud "Mariano Melgar" Arequipa.
- Determinar las características de la enfermedad de pacientes COVID 19 y su relación con la práctica de automedicación que acudieron al Centro de Salud "Mariano Melgar" Arequipa
- Asociar las comorbilidades con la práctica de automedicación de pacientes que acudieron al Centro de Salud "Mariano Melgar"
- Relacionar los aspectos clínicos de la enfermedad con la práctica de automedicación de pacientes COVID 19 que acudieron al Centro de Salud "Mariano Melgar" Arequipa.

5. HIPÓTESIS

Dado que, se desconoce los factores que pueden influir en la automedicación en atención primaria de la salud de pacientes COVID 19 del centro de salud "Mariano Melgar" Arequipa, es necesario evaluar las características sociodemográficas, actitudes, así como su relación con esta práctica.

Es probable que la actividad de automedicación está mayormente relacionada con características sociodemográficas como un bajo nivel de instrucción, género femenino, ocupación de ama de casa, la presencia de pocas o ninguna comorbilidad, una severidad leve de la enfermedad.





CAPITULO II

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL

1. Técnicas, instrumentos y materiales de verificación

1.1. Técnica:

Es un trabajo descriptivo, observacional, transversal, retrospectivo, de campo, relacional, correlacional.

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron observación y encuesta.

1.2. Instrumentos:

Ficha de la encuesta, ficha de recolección de datos de campo.

El instrumento se aplicó en 2 partes:

1. Revisión de la historia clínica de pacientes COVID 19 que consta de 13 ítems descritos a continuación:

Ítems	Nº
Características sociodemográficas: • Edad • Género • Grado de instrucción • Procedencia • Ocupación.	5
Características de la enfermedad: • Estado nutricional • Diagnóstico de COVID 19 • Saturación de O2 • Comorbilidades • Severidad del COVID 19 • Requirió O2 • Dispositivo para el O2 • Evolución.	8
Total	13

1. Encuesta: consta principalmente del consentimiento del paciente: que consta de 11 ítems descritos a continuación:

Ítem	Nº
Características de la automedicación: • Buscó atención de salud antes de acudir al CS Mariano Melgar. • Se automedicó • Con que sustancia se automedicó. • Que fuente y/o agente lo alentó a la automedicación. • Consumió la sustancia de dióxido de cloro. • Cuanto tiempo la consumió dióxido de cloro. • Para que molestia tomó el dióxido de cloro. • Como era la preparación del dióxido de cloro. • Donde consiguió el dióxido de cloro. • Quién se le indicó dióxido de cloro. • Algún posible efecto secundario que el paciente le atribuya al consumo de dióxido de cloro.	11

1.3. Materiales:

- 01 laptop Lenovo
- 01 impresora Epson
- 02 celulares
- 01 USB
- 02 chips
- Ordenador personal con sistema operativo Windows 10
- Paquete Office 2016

2. Campo de verificación

2.1. Ubicación espacial:

El estudio se realizó en el Centro de Salud "Mariano Melgar", Arequipa - Perú.

2.2. Ubicación temporal:

El estudio se desarrolló en mayo del año 2022

2.3. Unidades de estudio:

Historia clínica de paciente con diagnóstico de COVID 19 atendido en el Centro de Salud "Mariano Melgar" 2020 - 2021, Arequipa - Perú.

Pacientes con episodios de COVID 19 entre los periodos 2020 – 2021.

2.3.1. Población:

- Universal: el total de pacientes con historias clínicas con diagnóstico de COVID 19 que acuden al centro de salud "Mariano Melgar" 2020 - 2021: Total de población: 2500 personas.
- Muestra: Tamaño de muestra: 216. Procedimiento de muestreo: no probabilístico. Para el proceso de cálculo de la muestra se usó el software proporcionado por la unidad de epidemiología clínica y bioestadística Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (1).

Estimación de la proporción según FISTERRA	
Total de población	2500
Nivel de confianza o seguridad	95%
Precisión	5%
Proporción valor aproximado del parámetro que queremos medir	15%
Tamaño muestral ajustado a pérdidas	
Proporción esperada de pérdidas	15%
Muestra ajustada a las pérdidas	216

Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Criterios de selección

2.3.2.1. Criterios de inclusión:

- Mayores de edad
- Paciente con Historia Clínica y Ficha epidemiológica.
- Historia clínica de paciente con prueba positiva para COVID 19 atendidos en el periodo 2020 – 2021,
- Historia clínica de paciente que pertenecen a la jurisdicción del centro de Salud “Mariano Melgar”.

2.3.2.2. Criterios de exclusión:

- Historia clínica incompleta, en mal estado o ilegibles.
- Historia clínica de pacientes transeúntes.
- Historia clínica de pacientes gestantes y púrpas.

3. Estrategia de Recolección de datos

3.1. Organización

3.1.1. Recursos

- Humanos: Asesor, investigadores.
- Materiales
- Laptop Lenovo
- Tablet Samsung
- Programa de Microsoft Office
- Chips de telefonía móvil
- Celulares
- Financieros: De los propios autores

3.2. Validación de instrumentos

El presente instrumento fue elaborado por la Dra. Águeda Muñoz del Carpio Toia, posteriormente adaptado por las autoras en base a la revisión bibliográfica y validada por el juicio de tres expertos.

3.3. Criterios para manejo de resultados

3.3.1. Plan de Procesamiento:

La información obtenida se sistematizará en una matriz de datos de Excel, de acuerdo con las variables del estudio, posteriormente se analizó la integridad de los datos para eliminar cuestionarios que no son válidos sea porque están incompletos o nulos, etc (1).

3.3.2. Plan de Codificación:

Se codificó los datos obtenidos, de acuerdo con las variables y sus valores.

3.3.3. Estrategia de Análisis:

Se aplicó estadística buscando relación de variables, mediante el programa SPSS. Se calculó estadísticos descriptivos, mostrándose resultados en tablas y gráficos; mediante la prueba estadística de Chi cuadrado buscándose la relación entre variables. Por lo que se tomó en cuenta resultados significativos cuando la p es menor a 0,05 (1).

Para poder hallar la correlación entre variables se usó el índice de Phi de Cramer, el cual se muestra en la siguiente tabla:

Valores concretos del índice V de Cramer	Criterio
De 0 a 0,10	Se puede decir que no hay efecto (el grado es despreciable).
Desde 0,10 hasta 0,30	Se puede decir que el efecto es pequeño.
Desde 0,30 hasta 0,50	Se puede decir que el efecto es mediano o moderado.
desde 0,50 hasta 1,00	Se puede decir que el efecto es grande.

Fuente: Zavala, Salcedo (1)



CAPÍTULO III

RESULTADOS

TABLA 1
FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN
EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD
MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: PRÁCTICA DE
AUTOMEDICACIÓN DURANTE ENFERMEDAD COVID 19


	F	%
Si	118	54.6
Si, solo plantas medicinales	62	28.7
No	36	16.7
Total	216	100.0

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se observa una alta práctica de automedicación en los pacientes COVID 19. El 54.6% de los pacientes si se automedicó, en tanto que el 28.7% de los pacientes se automedicaron exclusivamente con plantas medicinales, finalmente el 16.7% de los pacientes no se automedicó.

GRÁFICO 1

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: PRÁCTICA DE AUTOMEDICACIÓN DURANTE ENFERMEDAD COVID 19



Fuente: Elaboración propia

En el gráfico se observa una alta práctica de automedicación en los pacientes COVID 19. El 54.6% de los pacientes si se automedicó, en tanto que el 28.7% de los pacientes se automedicaron exclusivamente con plantas medicinales, finalmente el 16.7% de los pacientes no se automedicó.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

TABLA 2

**FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN
EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD
MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE
AUTOMEDICACIÓN Y GÉNERO DE PACIENTES COVID 19.**

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%	F	%
Género	Masculino	58	26.9%	24	11.1%	16	7.4%	98	45.4%
	Femenino	60	27.8%	38	17.6%	20	9.3%	118	54.6%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%

$$X^2 = 1,803$$

$$p = 0,406$$

$$\text{Phi de Cramer} = 0.91$$

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se puede apreciar que el 54.6% pertenecen al género femenino del cual el 45.4% se automedica. Según la prueba de X^2 ($p > 0.05$), no existe relación estadísticamente significativa entre las variables, Pero posee un coeficiente Phi de Cramer (0.91), lo cual indica que existe una correlación alta entre género y la práctica de automedicación.

..

TABLA 3

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD

MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE

AUTOMEDICACIÓN Y EDAD DE PACIENTES COVID 19.

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%	F	%
Edad	Jóvenes (18-29)	31	14.4%	8	3,7%	15	6.9%	54	25.0%
	Adultos (30–59)	71	32.9%	41	19.0%	13	6.0%	125	57.9%
	Adultos mayores (>= 60)	16	7.4%	13	6.0%	8	3.7%	37	17.1%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%


$$X^2 = 13,445 \quad p = 0,009$$

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se observa que predomina el grupo etario de adultos (57.9%), siendo a la vez el que más se automedica, seguido del grupo de jóvenes. Ambos encajan en el grupo de “edad laboral”. Según la prueba X2 ($p < 0.05$), existe relación estadísticamente significativa entre la edad y la práctica de automedicación.

GRÁFICO 2

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y EDAD DE PACIENTES COVID 19.



Fuente: Elaboración propia

En el gráfico se observa que predomina el grupo etario de adultos (57.9%), siendo a la vez el que más se automedica, seguido del grupo de jóvenes.

TABLA 4

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD

MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE

AUTOMEDICACIÓN Y GRADO DE INSTRUCCIÓN DE PACIENTES COVID 19.

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%	F	%
Grado de instrucción:	Analfabeto	1	0.5%	2	0.9%	1	0.5%	4	1.9%
	Primaria completa	7	3.2%	5	2.3%	0	0.0%	12	5.6%
	Primaria incompleta	4	1.9%	3	1.4%	3	1.4%	10	4.6%
	Secundaria incompleta	3	1.4%	2	0.9%	0	0.0%	5	2.3%
	Secundaria completa	54	25.0%	30	13.9%	15	6.9%	99	45.8%
	Técnico superior	24	11.1%	10	4.6%	6	2.8%	40	18.5%
	Superior universitario	25	11.6%	10	4.6%	11	5.1%	46	21.3%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%
X ² = 9,641		p = 0,647		Phi de Cramer = 0.211					

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se aprecia que prima el grupo de estudios básicos (58.3%) conformados por primaria y secundaria, siendo a la vez los que más se automedican (50.0%) Con la prueba de X^2 ($p > 0.05$), se puede apreciar que no existe relación estadísticamente significativa entre las variables, pero mediante el coeficiente Phi de Cramer = 0.211, se observa una correlación baja entre el grado de instrucción y la práctica de automedicación.

TABLA 5
FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN
EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD
MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE
AUTOMEDICACIÓN Y OCUPACIÓN DE PACIENTES COVID 19.

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%		
Ocupación:	Ama de casa	30	13.9%	19	8.8%	9	4.2%	58	26.9%
	Estudiante	23	10.6%	4	1.9%	8	3.7%	35	16.2%
	Personal de Salud	1	0.5%	1	0.5%	2	0.9%	4	1.9%
	Trabajador independiente	52	24.1%	33	15.3%	13	6.0%	98	45.4%
	Trabajador dependiente	12	5.6%	3	1.4%	2	0.9%	17	7.9%
	Otros	0	0.0%	2	0.9%	2	0.9%	4	1.9%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%

$X^2 = 17,841$ $p = 0,058$ **Phi de Cramer = 0.211**

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se observa que sobresale el grupo “trabajador independiente” (45.4%) y es a la vez el que más se automedica (39.4%), seguido del grupo “amas de casa” (26.9%). Según la prueba de X^2 ($p > 0.05$) no existe relación estadísticamente significativa entre las variables, mediante el coeficiente Phi de Cramer = 0.211, se puede apreciar una correlación baja entre la ocupación y la práctica de automedicación.

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD

TABLA 6

**FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN
EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD
MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE
AUTOMEDICACIÓN Y ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES COVID 19.**

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%	F	%
Estado nutricional	Bajo peso	0	0.0%	2	0.9%	1	0.5%	3	1.4%
	Normo peso	46	21.3%	22	10.2%	18	8.3%	86	39.8%
	Sobrepeso	44	20.4%	19	8.8%	11	5.1%	74	34.3%
	Obesidad	28	13.0%	19	8.8%	6	2.8%	53	24.5%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%

$X^2 = 7,475$ $p = 0,279$ Phi de Cramer = 0.132

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se puede evidenciar, que destaca el estado nutricional normopeso siendo el que más se automedica. Según la prueba de X^2 ($p > 0.05$) se puede apreciar que no existe relación estadísticamente significativa entre las variables, y mediante el coeficiente Phi de Cramer = 0.132, establece una correlación baja entre estado nutricional y automedicación.

TABLA 7

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD

MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE

AUTOMEDICACIÓN Y TIPO DE PRUEBA DE PACIENTES COVID 19.

		¿Se automedicó?							
		Si		Si, solo plantas medicinales		No		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%
Tipo de prueba	Rápida	91	42.1%	40	18.5%	27	12.5%	158	73.1%
	Molecular	27	12.5%	22	10.2%	9	4.2%	58	26.9%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%

$$X^2 = 3,362 \quad p = 0,186$$

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se puede observar, que la prueba laboratorial más usada fue la rápida. Según la prueba de X^2 ($p > 0.05$) se puede apreciar que no existe relación estadísticamente significativa entre las variables.

TABLA 8
FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN
EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD
MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE
AUTOMEDICACIÓN Y COMORBILIDADES DE PACIENTES COVID 19

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%	F	%
Comorbilidades	Ninguna comorbilidad	37	17.1%	18	8.3%	15	6.9%	70	32.4%
	Presenta una comorbilidad	64	29.6%	32	14.8%	13	6.0%	109	50.5%
	Presenta dos comorbilidades	13	6.0%	6	2.8%	6	2.8%	25	11.6%
	Presenta más de dos comorbilidades	4	1.9%	6	2.8%	2	0.9%	12	5.6%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%
X ² = 6,953 p = 0,325		Phi de Cramer = 0.179							

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se observa, que el grupo que destaca es el de “una comorbilidad” siendo al mismo tiempo los que más se automedican, seguida del grupo sin comorbilidades. Mediante la prueba de X^2 ($p > 0.05$) se establece que no existe relación estadísticamente significativa entre las variables, y mediante el coeficiente Phi de Cramer = 0.179, se observa que existe baja correlación entre comorbilidad y práctica de automedicación de donde se entiende que las personas tienden más a practicar la automedicación al tener solo una o ninguna comorbilidad.

TABLA 9
FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN
EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD
MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: COMORBILIDADES
PRESENTES EN PACIENTES COVID 19.


		F	%
Diabetes Mellitus	Si	6	2.8
	No	210	97.2
Hipertensión Arterial	Si	15	6.9
	No	201	93.1
Obesidad	Si	44	20.4
	No	172	79.6
Sobrepeso	Si	74	34.3
	No	142	65.7
Otros	Si	37	17.1
	No	179	82.9
Total		216	100.0

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla se puede observar que el 34.3% presentan sobrepeso, seguido por el 20.4% que presenta obesidad que son los grupos que mayormente se automedican en ese orden de importancia.

GRÁFICO 3

**FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN
EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD
MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: COMORBILIDADES
PRESENTES EN PACIENTES COVID 19.**



Fuente: Elaboración propia

En el grafico se puede observar que el 34.3% presentan sobrepeso, seguido por el 20.4% que presenta obesidad que son los grupos que mayormente se automedican en ese orden de importancia.

TABLA 10
FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN
EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD
MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE
AUTOMEDICACIÓN Y SATURACIÓN DE O2 DE PACIENTES COVID 19.

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%		
SATURACION DE O2	Normal	101	46.8%	59	27.3%	32	14.8%	192	88.9%
	Hipoxia leve	13	6.0%	1	0.5%	2	0.9%	16	7.4%
	Hipoxia moderada	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	Hipoxia severa	3	1.4%	2	0.9%	2	0.9%	7	3.2%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%
X ² = 7,074		p = 0,314		Phi de Cramer = 0.181					

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se evidencia, que resalta la saturación normal (88.9%), siendo la que más se automedica, y mediante la prueba de X^2 ($p > 0.05$) se observa que no existe relación estadísticamente significativa entre las variables, pero mediante el cálculo del coeficiente Phi de Cramer = 0.181, se observa una correlación baja entre la saturación de O2 y la práctica de automedicación.

TABLA 11

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD

MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE

AUTOMEDICACIÓN Y SEVERIDAD DE PACIENTES COVID 19.

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%		
Severidad del COVID 19	Leve	109	50.5%	59	27.3%	32	14.8%	200	92.6%
	Moderada	9	4.2%	3	1.4%	4	1.9%	16	7.4%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%

 $X^2 = 1,325$
 $p = 0,516$
 Φ de Cramer = 0.078

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se puede observar que sobresale el grupo de severidad leve, y mediante la prueba de X^2 ($p > 0.05$) se aprecia que no existe relación estadísticamente significativa entre las variables y tampoco se halla correlación (Φ de Cramer = 0.078).

TABLA 12

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD

MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE

AUTOMEDICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE O2 DE PACIENTES COVID 19.

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%	F	%
Requirió oxígeno	Si	12	5.6%	2	0.9%	3	1.4%	17	7.9%
	No	106	49.1%	60	27.8%	33	15.3%	199	92.1%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%

$$X^2 = 2,715 \quad p = 0,257$$

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se observa que el grupo que no requirió de oxígeno (92.1%) es el que predomina siendo a la vez el que mayor automedicación registra. Mediante la prueba de X^2 ($p > 0.05$) se evidencia que no existe relación estadísticamente significativa entre las variables.

TABLA 13

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD

MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE

AUTOMEDICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE PACIENTES COVID 19.

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%	F	%
Evolución	Alta	109	50.5%	61	28.2%	31	14.4%	201	93.1%
	Fallecido	0	0.0%	1	0.5%	1	0.5%	2	0.9%
	Se trasladó a un centro de mayor complejidad	9	4.2%	0	0.0%	4	1.9%	13	6.0%
	Total	118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%

 $X^2 = 8,914$
 $p = 0,063$
 $\text{Phi de Cramer} = 0.203$

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se aprecia que destaca el grupo de alta (93.1%) siendo a la vez el que más se automedicó. Mediante la prueba de X^2 ($p > 0.05$) se observa que no existe relación estadísticamente significativa entre las variables y tampoco presenta correlación (coeficiente Phi de Cramer = 0.203) con la práctica de automedicación.

CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOMEDICACIÓN

TABLA 14

**FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN
EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD
MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE
AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON
IVERMECTINA EN PACIENTES COVID 19.**

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%	F	%
[Ivermectina]	La indicó un familiar	18	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	18	8,3%
	Yo solo elegí tomarla	11	5,1%	0	0,0%	0	0,0%	11	5,1%
	La indicó un vecino	1	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%
	La indicó un medico	5	2,3%	0	0,0%	4	1,9%	9	4,2%
	La conoció en redes y/o medios de comunicación	2	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,9%
	La indicó un amigo	3	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,4%
	No tomo esta medicina	72	33,3%	62	28,7%	32	14,8%	166	76,9%
	Otro: personal de salud no médico	6	2,8%	0	0,0%	0	0,0%	6	2,8%
Total		118	54,6%	62	28,7%	36	16,7%	216	100,0%


$$X^2 = 49,654 \quad p = 0,000$$

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla se muestra que el 19% se automedicó con ivermectina, siendo recomendada su consumo principalmente por la familia. Mediante la prueba de X^2 ($p < 0.05$) se puede apreciar que existe relación estadísticamente significativa entre la recomendación del familiar para utilizar la ivermectina en la práctica de automedicación para la prevención y/o tratamiento de los pacientes con episodios COVID 19, 2020 – 2021.

GRÁFICO 4

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON IVERMECTINA EN PACIENTES COVID 19.



Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico se muestra que el 19% se automedicó con ivermectina, siendo recomendada su consumo principalmente por la familia.

*En general la ivermectina fue la tercera sustancia más consumida por los pacientes para prevención y/o tratamiento de su episodio COVID 19.

TABLA 15

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD

MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE

AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON

DIÓXIDO DE CLORO EN PACIENTES COVID 19.

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%	F	%
[Dióxido de cloro]	La indicó un familiar	10	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	10	4.6%
	Yo solo elegí tomarla	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%
	La indicó un medico	2	0.9%	1	0.5%	2	0.9%	5	2.3%
	La indicó un amigo	8	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	3.7%
	No tomo esta medicina	94	43.5%	61	28.2%	34	15.7%	189	87.5%
	Otro: personal de salud no médico	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%


$$X^2 = 22,099 \quad p = 0,015$$

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla se puede observar que el 10.1% se automedicó con dióxido de cloro, siendo recomendada su consumo principalmente por la familia. Mediante la prueba de X^2 ($p < 0.05$) se puede apreciar que existe relación estadísticamente significativa entre la recomendación del familiar para utilizar el dióxido de cloro en la práctica de automedicación para la prevención y/o tratamiento de los pacientes con episodios COVID 19, 2020 – 2021.

GRÁFICO 5

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON DIÓXIDO DE CLORO EN PACIENTES COVID 19.



Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico se muestra que el 10.1% se automedicó con dióxido de cloro, siendo recomendada su consumo principalmente por la familia.

*En general la ivermectina fue la cuarta sustancia más consumida por los pacientes para prevención y/o tratamiento de su episodio COVID 19.

TABLA 16

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD

MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE

AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON

AZITROMICINA EN PACIENTES COVID 19.

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%	F	%
[Azitromicina]	La indicó un familiar	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.4%
	Yo solo elegí tomarla	8	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	3.7%
	La indicó un medico	3	1.4%	1	0.5%	4	1.9%	8	3.7%
	La indicó un amigo	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%
	No tomo esta medicina	95	44.0%	61	28.2%	32	14.8%	188	87.0%
	Otro: personal de salud no médico	7	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.2%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%
		X ² = 24,445 p = 0,006							

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla se muestra que el 9.2% se automedicó con azitromicina, siendo en su mayoría consumida por decisión propia. Mediante la prueba de X^2 ($p < 0.05$) se puede apreciar que existe relación estadísticamente significativa entre la decisión propia de usar azitromicina en la práctica de automedicación para la prevención y/o tratamiento de los pacientes con episodios COVID 19, 2020 – 2021.

*En general la azitromicina fue el antibiótico de mayor consumo por los pacientes para prevención y/o tratamiento de su episodio COVID 19.

TABLA 17

**FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN
EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD
MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE
AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON
CEFTRIAXONA EN PACIENTES COVID 19.**

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%	F	%
[Ceftriaxona]	La indicó un medico	4	1.9%	2	0.9%	2	0.9%	8	3.7%
	No tomo esta medicina	108	50.0%	60	27.8%	34	15.7%	202	93.5%
	Otro: personal de salud no médico	6	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	6	2.8%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%

$$X^2 = 5,510 \quad p = 0,239$$

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla se muestra que el 2.8% se automedicó con ceftriaxona, siendo en su mayoría consumida por recomendación de personal de salud no médico. Mediante la prueba de X^2 ($p > 0.05$), se puede apreciar que no existe relación estadísticamente significativa entre la recomendación por personal de salud no médico de consumir ceftriaxona en la práctica de automedicación para la prevención y/o tratamiento de los pacientes con episodios COVID 19, 2020 – 2021.

TABLA 18

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD

MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE

AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON

PARACETAMOL EN PACIENTES COVID 19.

		¿Se automedicó?						Total	
		Si, solo plantas medicinales				No			
		Si							
		F	%	F	%	F	%	F	%
[Paracetamol]	La indicó un familiar	9	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	9	4.2%
	Yo solo elegí tomarla	31	14.4%	0	0.0%	0	0.0%	31	14.4%
	La indicó un medico	3	1.4%	1	0.5%	2	0.9%	6	2.8%
	La conoció en redes y/o medios de comunicación	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	La indicó un amigo	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%
	No tomo esta medicina	57	26.4%	61	28.2%	34	15.7%	152	70.4%
	Otro: personal de salud no médico	15	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	15	6.9%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%


$$X^2 = 67,541 \quad p = 0,000$$

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla se muestra que el 26.9% se automedicó con paracetamol, siendo consumida por decisión propia. Mediante la prueba de X^2 ($p < 0.05$) se puede apreciar que existe relación estadísticamente significativa entre la decisión propia de usar paracetamol en la práctica de automedicación para la prevención y/o tratamiento de los pacientes con episodios COVID 19, 2020 – 2021.

GRÁFICO 6

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN CON PARACETAMOL EN PACIENTES COVID 19.



Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico se muestra que el 26.9% se automedicó con paracetamol, siendo consumida por decisión propia.

*En general el paracetamol fue el segundo medicamento más consumida por los pacientes para prevención y/o tratamiento de su episodio COVID 19.

TABLA 19

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD

MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE

AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN DE

PLANTAS MEDICINALES EN PACIENTES COVID 19.

		¿Se automedicó?						Total	
		Si		Si, solo plantas medicinales		No			
		F	%	F	%	F	%		
[Plantas medicinales]	La indicó un familiar	12	5.6%	11	5.1%	0	0.0%	23	10.6%
	Yo solo elegí tomarla	66	30.6%	49	22.7%	0	0.0%	115	53.2%
	La conoció en redes y/o medios de comunicación	3	1.4%	1	0.5%	0	0.0%	4	1.9%
	La indicó un amigo	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%
	No tomo esta medicina	37	17.1%	0	0.0%	36	16.7%	73	33.8%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%


$$X^2 = 105,185 \quad p = 0,000$$

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla se muestra que el 37.6% se automedicó con plantas medicinales, siendo en su mayoría consumida por decisión propia. Mediante la prueba de X^2 ($p < 0.05$) se puede apreciar que existe relación estadísticamente significativa entre la decisión propia de usar azitromicina en la práctica de automedicación para la prevención y/o tratamiento de los pacientes con episodios COVID 19, 2020 – 2021.

GRÁFICO 7

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES EN PACIENTES COVID 19.



Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica se muestra que el 37.6% se automedicó con plantas medicinales, siendo en su mayoría consumida por decisión propia.

*Las plantas medicinales ocupan el primer lugar en sustancias consumidas por los pacientes para prevención y/o tratamiento de su episodio COVID 19.

TABLA 20

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD

MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: RELACIÓN ENTRE

AUTOMEDICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE AUTOMEDICACIÓN DE

DEXAMETASONA EN PACIENTES COVID 19.

		¿Se automedicó?						Total	
		Si, solo plantas medicinales				No			
		Si							
		F	%	F	%	F	%	F	%
[Dexametasona]	Yo solo elegí tomarla	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.4%
	La indicó un medico	8	3.7%	4	1.9%	0	0.0%	12	5.6%
	No tomo esta medicina	101	46.8%	58	26.9%	36	16.7%	195	90.3%
	Otro: personal de salud no médico	6	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	6	2.8%
Total		118	54.6%	62	28.7%	36	16.7%	216	100.0%

$$X^2 = 10,620 \quad p = 0,101$$

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla se muestra que el 7.9% se automedicó con dexametasona, siendo en su mayoría consumida por la recomendación de personal de salud no médico. .

TABLA 21


**FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN
EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD
MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: FUENTES Y/O AGENTES QUE
CONTRIBUYEN CON LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19.**

Fuente y/o agente	F	%
Familia	64	29,7
Yo	170	78,8
Vecino	1	0,5
Redes	7	3,3
Amigo	16	7,4
Personal de salud, no médico	44	20,4

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 8

**FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN
EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD
MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021: FUENTES Y/O AGENTES QUE
CONTRIBUYEN CON LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19.**



Fuente: Elaboración propia

En la tabla y grafica muestran que la práctica de automedicación en su mayoría es realizada por decisión propia (78.8%), y el agente que mayor influencia tiene sobre la decisión de automedicación la constituye la familia (29.7%).

DISCUSIÓN

El estudio se realizó debido a la importancia del conocimiento sobre los principales factores determinantes de la automedicación en nuestro entorno y la relación entre estos factores y la práctica de automedicación. El conocimiento obtenido será útil para educar a la población y esta tenga una mejor respuesta a situaciones futuras similares, además de lograr mitigar en algo dicha práctica, así como los efectos adversos que conlleva.

Respondiendo al primer objetivo; de los pacientes COVID 19 atendidos en el centro de salud Mariano Melgar, el género femenino se automedicó más (45.4%). El grupo etario de “adultos” (30-59 años) fue el de mayor frecuencia de automedicación (51.9%). En lo referente a grado de instrucción predomina en frecuencia de automedicación el grupo de “estudios de nivel básico” (primaria y secundaria) 50.0%. En cuanto a la ocupación el grupo de “trabajador independiente” se automedicó más (39.4%). Estos resultados concuerdan con la investigación realizada por Ayamamani, et al; Titulada: Principales características y factores asociados a la automedicación de un centro de salud en la Región Callao (Centro médico municipal de Bellavista). “El grupo etario con mayor prevalencia en automedicación fueron adultos (30-59 años) 60.4%, el 58.4% de sexo femenino, 71.8% son independientes” (22), del mismo modo concuerda con Navarrete Mejia, et al titulado: Automedicación en época de pandemia: Covid-19. “Sexo femenino (51.08%), educación primaria/secundaria 61.0% de los casos” (29). Sin embargo, Zavala y Salcedo, et al: titulada: Medicación prehospitalaria en pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital público de Lima-Perú. “El sexo masculino predominó (69,7%)” presenta una fuerte variación en comparación al presente estudio porque es conocido que el género masculino presenta mayor mortalidad y complicaciones en lo cuanto a la enfermedad del COVID 19 (1).

Los resultados en cuanto a características sociodemográficas, corresponden con lo encontrado según el último censo INEI 2017 en la población de M. Melgar: Hombres 48.06%, mujeres 51.94%, grupos etarios adultos (30-59), 38.15%, jóvenes (18-29) 21.81%, grado de instrucción “estudios de nivel básico” 51.64% y estudios superiores 38.56% (31). Entonces de los factores sociodemográficos solo la edad tiene una relación significativa con la práctica de automedicación($p < 0.05$), si bien el resto no presentan una relación

significativa, mediante la phi de Cramer podemos hallar cierta correlación de factores como género (phi de Cramer 0.91-correlación alta), grado de instrucción (phi de Cramer 0.211-correlación baja) y ocupación (phi de Cramer 0.211-correlación baja) con la práctica de automedicación. Podemos decir que la población de Mariano Melgar conformada principalmente por mujeres en edad laboral, de ocupación independiente y con estudios de nivel básico es la que muestra mayor inclinación a realizar la práctica de automedicación por necesitar mantenerse “activa y saludable” a diario para conservar su ingreso económico del día, del cual depende para cubrir su canasta básica familiar.

Para los factores que se refieren a las características de la enfermedad, se observa que ninguno presenta relación estadísticamente significativa con la práctica de la automedicación, pero se obtuvo mediante la prueba estadística de phi de Cramer un cierto grado de correlación entre la evolución, saturación de O₂, comorbilidades (phi de Cramer 0.179) y estado nutricional con la práctica de automedicación. Lo que podría indicar que el paciente mientras “más saludable” se perciba y mientras tenga la sensación de tener un “cuadro leve” de la enfermedad expresa mayor tendencia a automedicarse. El 57.9% presentaron comorbilidades, de los cuales un poco menos de la mitad presentó solo una comorbilidad (44.4%), la más frecuente fue el sobrepeso (34.3%), obesidad (20.4%), hipertensión arterial 6.9%, diabetes mellitus 2.8%, datos que contrastan con el estudio realizado por Navarrete-Mejía, et al, Titulado: Automedicación en época de pandemia: Covid-19. “Las comorbilidades observadas fueron hipertensión arterial (15,4%), sobrepeso/obesidad (13,7%), diabetes (7,1%) y cáncer (4,6%)” (29). Lo que apunta a que nuestra población arequipeña tiende al sobrepeso y obesidad, lo explicaría en gran parte que fuimos una de las ciudades más afectadas por el COVID19. El grupo con saturación normal con un 88.9%, fue el que más se automedicó en un 74.1%. El grupo severidad “leve” se automedicaron más en un 77.8% y el grupo que “no requirió oxígeno” se automedicaron más en un 76.9%. El 93.1% de los pacientes fueron dados de alta siendo los que mayor frecuencia de automedicación presentaron en un 78.7%, resultado que difiere totalmente con la investigación de Zavala y Salcedo, et al, donde se pueden observar que el 96,2% requirió oxígeno. Estas notorias diferencias se entienden debido a la severidad de COVID 19 de los pacientes atendidos según el nivel de resolución (1).

Se obtuvo una frecuencia de automedicación del 83.3%, siendo el 28.7% de esta exclusiva con plantas medicinales. Este resultado concuerda con las investigaciones realizadas por: Del Toro M, et al; que muestra “una prevalencia de la automedicación de 89,7%” que se

explica porque fue realizada en una localidad de bajo nivel educativo, en situación de pobreza, condiciones de vida poco adecuadas (30). Estos resultados muestran una práctica de la automedicación alta lo cual es un resultado esperado pues ya se había mencionado en diversos estudios que la práctica de automedicación es una actividad muy común de países con poblaciones con características sociodemográficas y sistemas de salud como la nuestra. y Makowska M, et. col 2020, en su investigación titulada: “Self-Medication-Related Behaviors and Poland's COVID-19 Lockdown. “Aquí el 45,6% indicaron que habían participado en al menos un comportamiento asociado con la automedicación”, sin embargo este valor a pesar de ser bajo en comparación al encontrado en el presente estudio evidencia el incremento de la práctica de automedicación en Polonia, puesto que el porcentaje de automedicación era de 22.4% antes del confinamiento por la pandemia, además hubieron cambios en los sistemas de salud de Polonia como facilitar el acceso a medicamentos de prescripción, cosa que esto estaba rígidamente regulados por el estado (28). En contraste con Zavala y Salcedo, et al aquí “el 33,9% se automedicó (sin receta médica) antes de ser hospitalizado”, es posible que este resultado es menor al encontrado en nuestro estudio porque los pacientes hospitalizados pueden negar esta práctica de automedicación por temor a ser responsabilizado por las complicaciones que le llevaron a ser hospitalizado (1).

De los medicamentos y sustancias usadas para la automedicación 19% consumió ivermectina; un ínfimo porcentaje refirió haber consumido ivermectina de uso veterinario. En lo que se refiere al uso de antibióticos la automedicación con azitromicina ocupó el primer lugar con un 9.2%. En corticoides las más usadas, dexametasona (7.9%) y prednisona (0.5%). Para el grupo de AINES, tenemos al paracetamol (26.9%). Mientras tanto, el 28.7% se automedicó solo con plantas medicinales y el 37.6% con plantas medicinales más otros medicamentos y/o sustancias a la vez. Navarrete-Mejía, et al. “Muestra que los medicamentos más usados en automedicación, previos a la pandemia fueron analgésico (29,1%), antiinflamatorios (28,1%), antibióticos (27,6%). Y los más consumidos durante la pandemia fueron: antibióticos/antiinflamatorios (39,2%), antiinflamatorio (30,9%), antibiótico (21,6%), ivermectina (5,7%) y la ivermectina en combinación con otros fármacos (2,6%)”. Entonces observamos que tanto los analgésicos como los antiinflamatorios son los más usados para la automedicación sea antes o durante la pandemia. Pero en nuestros resultados hallamos que la población durante la pandemia prefirió el consumo de plantas medicinales y/o productos herbolarios, por percibirlos como

inocuos además de formar parte de su tradición y costumbres, seguido del uso de analgésicos e ivermectina en ese orden de frecuencia e importancia (29). Lo que podría deberse a que en el contexto del inicio de la pandemia COVID 19 en nuestro país no se conocía mucho o nada sobre la enfermedad, su tratamiento e incluso su prevención por lo que se tuvo que implementar sobre la marcha medidas que nuestra población tuvo que aprender y a la vez adoptar, como es lógico se cometieron errores, muestra de ello es el kit COVID implementado por el MINSA el 8 de mayo del 2020 que incluía precisamente los medicamentos mencionados, se pudo apreciar fácilmente una escasez de medicamentos principalmente la azitromicina e ivermectina, así como el alza exagerada en los precios lo que se hacía más notorio a medida que pasaba el tiempo (32).

En tanto con la investigación realizada por Del Toro M, et al; “La principal influencia para realizar la práctica de automedicación proviene de la familia (49,3%)”, lo que contrasta con nuestros resultados al ser realizada esta práctica en su mayoría por decisión propia (78.8%) (30). Fueron muy escasas las investigaciones encontradas sobre automedicación con productos herbolarios y/o plantas medicinales de los cuáles la investigación realizada por REYNOSO, et al; cuyos resultados muestran que “la prevalencia del consumo de remedios herbolarios fue de 40.25%” lo que refleja el uso común de plantas medicinales que se da en nuestra población (66.4%), mencionado líneas arriba (30).

Al mismo tiempo, Castañeda Huillcahuaman: Nivel de conocimiento sobre automedicación con dióxido de cloro para el tratamiento preventivo de COVID-19 en comerciantes del mercado Santa Rosa de América de San Juan de Lurigancho, 2020. “El porcentaje menor de la población que consumió dióxido de cloro para tratamiento preventivo de COVID-19 es del 12%, cifra poco preocupante, sin embargo, esto a lo largo del tiempo puede conllevar a muchos problemas de salud si no se informa y se sigue consumiendo o incrementar su consumo, al ser más de la mitad de la población de estudio que desconoce los efectos adversos (57%)”, esta cifra guarda similitud con nuestros resultados (10.1%) (33).

También podemos acotar que durante nuestra investigación los pacientes consumidores de dióxido de cloro refirieron haberla consumido en su mayoría como medida preventiva durante un máximo de 3 meses y un mínimo de 1 día, la principal molestia para la cual fue consumida fue la dificultad respiratoria y la tos, la mayoría no le atribuyeron ningún efecto adverso y a la vez manifestaron que sentían disminución de la dificultad respiratoria; para

la preparación para el consumo de esta sustancia los pacientes en su mayoría refirieron diluir 5 ml de dióxido de cloro (del cual desconocen la concentración) en 1000 ml de agua.



CONCLUSIONES

PRIMERA:

Se obtuvo una frecuencia de automedicación alta y en su mayoría adultos de género femenino, con nivel de instrucción básica (primaria y secundaria), cuya ocupación es “independiente” lo que refleja que fue una práctica habitual durante la pandemia.

SEGUNDA:

Se logró identificar dentro de los factores sociodemográficos que determinan la práctica de automedicación, la edad presenta una relación significativa, por lo tanto, se entiende que influiría en dicha actividad, pero se observó que el género presenta un alto grado de correlación con la práctica de automedicación, así como el grado de instrucción y la ocupación que presentan una correlación baja. Podemos decir que la población de Mariano Melgar conformada principalmente por mujeres en edad laboral, de ocupación independiente y con estudios de nivel básico es la que muestra mayor inclinación a realizar la práctica de automedicación por necesitar mantenerse “activa y saludable” a diario para conservar su ingreso económico del día, del cual depende para cubrir su canasta básica familiar.

TERCERA:

En las características de la enfermedad estudiadas como el estado nutricional, tipo de prueba, saturación de oxígeno, severidad del COVID 19, requerimiento de oxígeno, evolución, no se encontró relación significativa, pero si se observa una correlación, aunque baja entre comorbilidad y la actividad de automedicación. Lo que podría indicar que el paciente mientras “más saludable” se perciba y mientras tenga la sensación de tener un “cuadro leve” de la enfermedad expresa mayor tendencia a automedicarse.


CUARTA:

Se observa que, dentro de las características de la automedicación estudiadas como la actitud del paciente, fuentes y/o agentes que la impulsan no se encontró relación significativa, pero en lo que se refiere a sustancias o medicamentos utilizados en la automedicación se obtuvo relación

significativa en el uso de plantas medicinales, paracetamol, ivermectina, dióxido de cloro, y azitromicina además de cierta correlación con la práctica de automedicación en el orden antes mencionado. También se observó que la práctica de automedicación en su mayoría fue realizada por decisión propia.

QUINTA:

Se logró determinar que las sustancias y/o medicamentos aprobadas por la FDA más utilizados en automedicación fue el paracetamol seguida de la ivermectina, seguida de los antibióticos, las sustancias o medicamentos no aprobadas por la FDA más utilizados en automedicación fueron las plantas medicinales.



RECOMENDACIONES

PRIMERO:

A los investigadores de las diferentes facultades de ciencias de la salud, se recomienda realizar estudios descriptivos y analíticos sobre automedicación en diferentes niveles de atención en los distritos de la ciudad de Arequipa a fin de poder comparar y ampliar los factores que determinan esta práctica. Además de estudios sobre los factores de la automedicación en periodos antes y después de la existencia de la vacuna COVID 19.

SEGUNDO:

Se recomienda realizar estudios que incluyan variables como tiempo de enfermedad, síntoma(s) más frecuente por el que se automedicó, forma de contagio.

TERCERO

Se recomienda realizar estudios descriptivos y analíticos sobre automedicación con productos herbolarios y/o plantas medicinales. Sería interesante y útil la elaboración de un catálogo de los principales productos herbolarios o plantas medicinales más utilizados de la zona como anexo a estos estudios, con la finalidad de que llegue a cada profesional de salud en especial los que están por realizar su SERUM como una forma de lograr empatizar con el paciente, haciéndoles partícipes de su recuperación.

CUARTO

Se recomienda la elaboración de una pequeña guía de los efectos adversos de sustancias no aprobadas por la FDA más asequibles a la población en colaboración con las escuelas de farmacia y bioquímica, medicina veterinaria, con el fin de educar a la población sobre los peligros que conlleva consumir estas sustancias.

QUINTA:

Se recomienda a los médicos y personal del centro de salud Mariano Melgar encargados de consignar datos de los pacientes en las historias clínicas, se sugiere mejoren la elaboración y el llenado de las historias clínicas para que en el futuro se puedan investigar mas variables reacionadas a la automedicación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Zavala Flores E, Salcedo Matienzo J. Medicación prehospitalaria en pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital público de Lima-Perú. 2020;37(3):393-295.
2. Choudhary R, Sharma AK. Potential use of hydroxychloroquine, ivermectin and azithromycin drugs in fighting COVID-19: trends, scope and relevance. New Microbes New Infect. 22 de abril de 2020;35:100684.
3. Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para reforzar la respuesta sanitaria en el marco del estado de emergencia nacional por la COVID-19 y dicta otras medidas-DECRETO DE URGENCIA-N° 004-2021 [Internet]. Diario Oficial del Bicentenario El Peruano. Disponible en: <http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-pa-decreto-de-urgencia-n-004-2021-1920858-1/>
4. Tenorio-Mucha J, Lazo-Porras M, Hidalgo AM, Málaga G, Cárdenas MK, Tenorio-Mucha J, et al. Precios de medicamentos esenciales para el manejo y tratamiento de la COVID-19 en establecimientos farmacéuticos peruanos públicos y privados. Acta Médica Peru. julio de 2020;37(3):267-77.
5. Ministerio de salud. Que hay que tener en cuenta al leer un ensayo clínico. 2020. [Internet]. Disponible en: http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Boletines/Cenadim/B11_2006_04.pdf
6. Montoya Cabezas R, Ccala Larota JG. Conocimiento y práctica de automedicación con antibióticos en los estudiantes de ciencias de la salud de la universidad maría auxiliadora, 2018. Univ María Aux - UMA [Internet]. 29 de mayo de 2019; Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/handle/20.500.12970/191>
7. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Automedicación Disponible en: <https://www.who.int/es>
8. Organización mundial de la salud. El papel del farmacéutico en el autocuidado y la automedicación. Reunión Grupo Consult OMS SAFYB. La Haya de 1998;

9. Ramírez Puerta D, Larrubia Muñoz O, Escortell Mayor E, Martínez Martínez R. La automedicación responsable, la publicidad farmacéutica y su marco en la Atención Primaria. Med Fam SEMERGEN. 1 de marzo de 2006;32(3):117-24.
10. Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS. Crece el mapa de motivaciones para automedicarse | [Internet]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/4-3-2021-crece-mapa-motivaciones-para-automedicarse>
11. Ruiz-Sternberg ÁM, Pérez-Acosta AM. Automedicación y términos relacionados: una reflexión conceptual. Rev Cienc Salud. 2011;9(1):83-97.
12. Ministerio de salud. Ley N° 26842. 1997 [citado 14 de mayo de 2022]; Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/256661-26842>
13. Pillaca-Medina ML, Carrión-Dominquez K. Automedicación en personas adultas que acuden a boticas del distrito Jesús Nazareno, Ayacucho 2015. An Fac Med. octubre de 2016;77(4):387-92.
14. Lupa S con. Científicamente comprobado: un análisis de los tratamientos más usados contra la covid-19 [Internet]. Salud con lupa. 2022. Disponible en: <https://saludconlupa.com/comprueba/cientificamente-comprobado-un-analisis-de-los-tratamientos-mas-usados-contra-el-covid-19/>
15. Dahir C, Hernandorena C, Chagas L, Mackern K, Varela V, Alonso I. La automedicación: un determinante en el uso racional de medicamentos. Evid Actual En Práctica Ambulatoria [Internet]. 1 de julio de 2015;18(2). Disponible en: <https://www.evidencia.org/index.php/Evidencia/article/view/6328>
16. Hermoza-Moquillaza R, Loza-Munarriz C, Rodríguez-Hurtado D, Arellano-Sacramento C, Hermoza-Moquillaza V. Automedicación en un distrito de Lima Metropolitana, Perú. Rev Medica Hered. enero de 2016;27(1):15-21.
17. Henao-Kaffure L. O conceito de pandemia: debate e implicações sobre a pandemia de influenza de 2009. 2009;17.
18. Hospital ángeles. Qué es una pandemia [Internet]. Disponible en: <https://hospitalesangeles.com/covid-19/articulos/que-es-una-pandemia.php>
19. Ministerio de salud. R.M. 839-2020. 2020 [Internet]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1365531/R.M.%20839-2020.pdf.pdf>

20. Vega-Romero R, Vega-Romero R. Atención Primaria en Salud y COVID-19. Hacia Promoc Salud. diciembre de 2020;25(2):17-9.
21. Medina Tejada PA, Trujillo Salas MS. Factor social relacionado con la automedicación de la enfermera en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2016. Univ Nac San Agustín Arequipa [Internet]. 2016. [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/1802>
22. Ayamamani Quispe GW. Principales características y factores asociados a la automedicación de un centro de salud en la Región Callao. Univ Nac Federico Villarreal [Internet]. 2020; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/4305>
23. Miñan-Tapia A, Conde-Escobar A, Calderon-Arce D, Cáceres-Olazo D, Peña-Rios AJ, Donoso-Romero RC. Factores asociados a la automedicación con fármacos relacionados a COVID-19 en estudiantes de ciencias de la salud de una ciudad peruana [Internet]. SciELO Preprints; 2020. Disponible en: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/1225>
24. Lescano J, Chris P. Ivermectina dentro del protocolo de tratamiento para la COVID-19 en Perú: Uso sin evidencia científica | Salud y Tecnología Veterinaria. 2020;27-34.
25. Pari-Olarte JB, Cuba-García PA, Almeida-Galindo JS, Aliaga-Guillén NE, Solano-García CG, Chacaltana-Ramos LJ, et al. Factores asociados con la automedicación no responsable en el Perú. Rev Cuerpo Méd Hosp Nac Almanzor Aguinaga Asenjo. enero de 2021;14(1):29-34.
26. Reynoso, Hernández O, Guadalupe E. Prevalencia de la automedicación y del consumo de remedios herbolarios entre los usuarios de un centro de salud. :28. 2020 [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano].
27. Román BR, Moscoso S, Chung S ah, Terceros BL, Álvarez-Risco A, Yáñez JA. Tratamiento de la COVID-19 en Perú y Bolivia y los riesgos de la automedicación. Repos Inst - Ulima [Internet]. 2020; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/11641>

28. Makowska M, Boguszewski R, Nowakowski M, Podkowińska M. Self-Medication-Related Behaviors and Poland's COVID-19 Lockdown. *Int J Environ Res Public Health*. 11 de noviembre de 2020;17(22):E8344.
29. Navarrete-Mejía PJ, Velasco-Guerrero JC, Loro-Chero L. Automedicación en época de pandemia: Covid-19. *Rev Cuerpo Méd Hosp Nac Almanzor Aguinaga Asenjo*. octubre de 2020;13(4):350-5.
30. Del Toro Rubio M, Díaz Pérez A, Barrios Puerta Z, Castillo Avila IY. Automedicación y creencias en torno a su práctica en Cartagena, Colombia. *Rev Cuid*. 1 de enero de 2017;8(1):1509.
31. Instituto Nacional de Estadística e Informática [Internet]. 2020. Disponible en: <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/censos-2017-departamento-de-arequipa-cuenta-con-1-382-730-habitantes-11029/>
32. Ministerio de salud. Resolución Ministerial N° 270-2020-MINSA. 2020 [Internet]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/563764-270-2020-minsa>
33. Castañeda Huillcahuaman GV. Nivel de conocimiento sobre automedicación con dióxido de cloro para el tratamiento preventivo de covid-19 en comerciantes del mercado santa rosa de américa de san juan de lurigancho, 2020". [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. 2021; Disponible en: <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3016428>
34. Hinojosa Avilés RV, Palma Melgar FL. Automedicación y conocimiento de la enfermedad en familiares de pacientes hospitalizados por Covid-19 en el HNDAC en el año 2020. [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Repos Inst - URP [Internet]. 2021; Disponible en: <http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/3815>
35. Alderete Carhuas JJ, Quiquia Urribarre DD. Nivel de conocimiento de automedicación durante la pandemia del COVID-19 en personas adultas en la urbanización Ceres – ATE 2020. 10 de marzo de 2021; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3016387>
36. Espinoza Matos JE, Herrera Camac KA. Factores asociados a la automedicación en la ciudad de Huancayo en la pandemia del COVID- 19, 2020. *Univ Cont* [Internet].


- 2021; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/9178>
37. Huamán-Rodríguez MR, Aguilar-Urbina EW. Riesgos de la automedicación en el Perú del paciente con COVID-19: revisión narrativa. Rev Médica Trujillo [Internet]. 9 de marzo de 2021;16(1). Disponible en: <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/RMT/article/view/3330>
 38. Calderon-Ospina C, Andrés M, Soler-Esparragoza F. El Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario y su rol en la pandemia de covid-19. Rev Ciencias de la Salud [Internet]. 2020;18(2). Disponible en: <https://revistas.urosario.edu.co/xml/562/56263561001/html/index.html>
 39. Tejada SF, Medina-Neira D. La automedicación promovida por medios de comunicación, un peligro con consecuencias en tiempos de crisis de salud pública por COVID-19. Rev Cuba Inf En Cienc Salud [Internet]. 9 de septiembre de 2020;31(3). Disponible en: <http://www.acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/1632>
 40. Rodríguez-Silva CN, Tello-Reyna CR. La automedicación como riesgo de fracaso terapéutico contra el COVID-19. Rev Médica Trujillo [Internet]. 3 de septiembre de 2020;15(3). Disponible en: <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/RMT/article/view/3068>
 41. Medina Ramos JV, Pacahuala Rincon JE. Automedicación durante la pandemia Covid-19 en usuarios de 30 a 70 años de la botica Mi Luz en el distrito de Breña, julio 2020. 1 de marzo de 2021; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <http://repositorio.unid.edu.pe/handle/unid/82>
 42. Ferreyros Prieto LM, Figueroa Albertis JG. Evaluación de factores sociodemográficos y la automedicación en tiempos de Covid-19, en la población El Progreso-sector 2-Carabayllo, julio - 2020. 3 de marzo de 2021; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <http://repositorio.unid.edu.pe/handle/unid/95>
 43. Cuya Silva AS, Macotela Saboya PM. “Automedicación en trabajadores del mercado santa rosa chorrillos en los tiempos de covid-19 entre los meses de agosto – octubre 2020”. Repos Inst - UMA [Internet]. 21 de abril de 2021; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/handle/20.500.12970/469>


44. Irkñampa Gallardo SI. Automedicación en residentes del distrito de Los Olivos en el contexto del COVID-19. Univ Nac Mayor San Marcos [Internet]. 2021; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/17491>
45. Idone Soto EA, Quispe Rojas JR. Factores asociados en la automedicación del uso de la ivermectina en relación a la COVID-19, en la botica “EVELYN” del distrito de Cercado de Lima – 2021. 27 de diciembre de 2021; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/handle/20.500.12970/750>
46. Ulloa Alfaro YE. Automedicación durante el confinamiento por COVID-19 en un distrito de Trujillo. Univ Nac Trujillo [Internet]. 2021; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/16817>
47. Julcarima Rosales EM, Lima Silvera N. Factores condicionantes de la automedicación en tiempos de pandemia en el Distrito en Santa Anita – Lima 2020. 20 de diciembre de 2020; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3077787>
48. Delia MGS. Automedicación durante la pandemia por covid-19 en el adulto. Centro de salud palmira. Independencia. 2021. Univ Nac Santiago Antúnez Mayolo [Internet]. 17 de marzo de 2022; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/5021>
49. Salazar Montenegro VT, Verde Palacios NN. Factores condicionantes de la automedicación y su relación con el Covid19 en pobladores del AAHH Los Olivos Pro Lima 2020. 3 de marzo de 2021; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <http://repositorio.unid.edu.pe/handle/unid/94>
50. Gomes J da C, Silva JCA da, Batalha SSA. Ocorrência de automedicação na pandemia da COVID-19: uma revisão integrativa da literatura. Res Soc Dev. 4 de diciembre de 2021;10(16):e308101624049-e308101624049.
51. Ruiz JMG, Souza ÉF de, Paiva MJM de. A influência midiática para automedicação do novo coronavírus: revisão literária. Res Soc Dev. 4 de octubre de 2021;10(13):e53101321015-e53101321015.

52. Pimentel J, Andersson N. Cloroquina y sus derivados en el manejo de la COVID-19: una revisión sistemática exploratoria. Univ Sabana [Internet]. 30 de octubre de 2020; Disponible en: <https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/47825>
53. Escalante Saavedra PA, Cañas M, Calvo Barbado DM, Barajas Esparza L, Caffaratti M, Speranza N, et al. Tratamiento farmacológico para COVID-19 en protocolos latinoamericanos: una revisión narrativa de la eficacia y seguridad. Pharmacological treatment for COVID-19 in latin american protocols: A narrative review of the effectiveness and safety [Internet]. 14 de agosto de 2020; Disponible en: <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/16086>
54. Freires MS, Junior OMR. Resistência bacteriana pelo uso indiscriminado da azitromicina frente a Covid-19: uma revisão integrativa. Res Soc Dev. 7 de enero de 2022;11(1):e31611125035-e31611125035.
55. Bazan Melendez MD, Torres Talaverano JM. Impacto del tratamiento de las infecciones asociadas al COVID-19 en la resistencia bacteriana: Revisión crítica y propuesta farmacéutica. Univ Nac Mayor San Marcos [Internet]. 2022; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/18279>
56. Zapata JM, Villalva AA, Guamanarca RS, Naranjo EL, Sánchez KN, Vaca ÁL, et al. Cloroquina e hidroxiclороquina en el manejo del COVID-19: una revisión. Investig Desarro. 8 de diciembre de 2020;12(1):65.
57. Mesquita AK de F, Almeida MRS de, Nunes RPC, Julio RAG, Silva LS da, Silva DZ e, et al. A mudança da resolução como estratégias para evitar a automedicação à saúde em tempos de pandemia por Covid-19: uma revisão bibliográfica / Resolution change as strategies to avoid self-medication to health in times of a Covid-19 pandemic: uma bibliographic review. Braz J Health Rev. 3 de junio de 2022;5(3):10905-21.
58. Anampa Aldave KL, Carmen Villegas N. Nivel de conocimiento sobre la automedicación de antibióticos para el tratamiento covid-19 en los principales mercados de san juan de lurigancho. Repos Inst - UMA [Internet]. 6 de marzo de 2021; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/handle/20.500.12970/374>
59. Rivera chambí S, Puma Quispe SE. La automedicación en la pandemia por Covid-19 en pobladores de dos mercados más importantes de SJL – Lima 2020. 19 de diciembre

de 2020; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3081127>

60. Rodríguez Quito KM, Puntillo Cerna D. Factores demográficos relacionados a la automedicación por covid-19 en el personal administrativo, hospital de Barranca – Cajatambo. 2022; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <http://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/113>
61. Flores Solano GV, Tito Sulca CZ. Nivel de conocimiento y automedicación por Covid-19 en consumidores del mercado “Sagrado Corazón de Jesús” San Juan de Lurigancho, 2020. 3 de marzo de 2021; [Tesis para optar el título profesional de médico cirujano]. Disponible en: <http://repositorio.unid.edu.pe/handle/unid/88>
62. Moysés D de A, Galucio NC da R, Silva AM do N, Rocha AA, Costa JG da, Gabriel KA da S, et al. O papel do farmacêutico no controle, orientação e prevenção da automedicação em idosos: uma revisão da literatura. Res Soc Dev. 10 de abril de 2022;11(5):e37211528232-e37211528232.





ANEXO 1

DICTAMEN DE COMITÉ DE ÉTICA

COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN UCSM



DICTAMEN COMITÉ DE ETICA DE INVESTIGACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA

SUJETOS DE ESTUDIO:

El total de pacientes con sospecha y/o diagnóstico de COVID 19 que acuden al puesto de salud “Villa Jesús”.

RIESGO DEL ESTUDIO:

Mínimo

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS:

Debe proteger confidencialidad de la data sensible

DICTAMEN:



DICTAMEN FAVORABLE
054 - 2022



Ivo Palomino

Comité Institucional de Ética de la Investigación UCSM

Cualquier duda comunicarse a: comiteeticainvestigacionucsm@gmail.com

ANEXO 2

INSTRUMENTO

FACTORES DETERMINANTES RELACIONADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES COVID 19, ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA. CENTRO DE SALUD MARIANO MELGAR. AREQUIPA, 2020 – 2021

PROPÓSITO: Determinar los factores determinantes relacionados a la automedicación en pacientes COVID 19 atendidos en el Centro de salud "Mariano Melgar" Arequipa, 2020 – 2021.

PARTICIPACIÓN: Su participación es voluntaria y confidencial. Los resultados no llevarán su nombre o apellido o cualquier data que pueda identificarlo. Si usted acepta ser parte del estudio, está consintiendo participar en la entrevista y que un investigador miembro del grupo pueda leer su historia clínica hasta ser dado de alta y llamar a un familiar para que amplíe información sobre la medicación utilizada antes de mi ingreso al puesto de salud para atenderme por COVID 19. **DECLARACIÓN:** Yo autorizo de manera voluntaria mi participación en la presente investigación. He sido informado y entendido el propósito del estudio, los procedimientos, el carácter confidencial y voluntario del estudio.

- ☐ Si, acepto
- 1. Edad en años:
- 2. Género:
 - ☐ Masculino
 - ☐ Femenino
- 3. Grado de instrucción:
 - ☐ Analfabeto
 - ☐ Primaria incompleta
 - ☐ Primaria completa
 - ☐ Secundaria incompleta
 - ☐ Secundaria completa
 - ☐ Técnico superior
 - ☐ Universidad
- 4. Procedencia _____ (Nombre _____ del _____ distrito):
- 5. Identifique a qué servicio de salud ha acudido por temas de COVID 19 antes del ingresar al centro de salud "Mariano Melgar":
 - ☐ Solo acudí al centro de salud "Mariano Melgar"
 - ☐ Hospital Regional Honorio Delgado
 - ☐ Hospital Goyeneche
 - ☐ Hospital EsSalud
 - ☐ Clínica particular
 - ☐ Otros: _____
- 6. Ocupación:
 - ☐ Ama de casa
 - ☐ Estudiante
 - ☐ Personal de Salud
 - ☐ Trabajador independiente
 - ☐ Trabajador dependiente
 - ☐ Otros: _____
- 7. Estado nutricional:
 - ☐ Bajo peso
 - ☐ Normopeso
 - ☐ Sobrepeso
 - ☐ Obesidad
- 8. Diagnóstico de COVID 19:
 - ☐ Diagnóstico clínico (síntomas)
 - ☐ Prueba rápida

- ☐ Prueba molecular
- ☐ Tomografía
- ☐ Otros: _____
9. Saturación de oxígeno al ingreso Sat O2:
10. Comorbilidades:
- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ No sabe
11. Comorbilidades:
- ☐ Diabetes mellitus
- ☐ Hipertensión arterial
- ☐ Asma
- ☐ EPOC
- ☐ Enfermedad cardiovascular
- ☐ Obesidad
- ☐ Hepatopatía crónica
- ☐ Enfermedad renal crónica
- ☐ Neoplasia
- ☐ Inmunosupresión
- ☐ Ninguna comorbilidad
- ☐ Otra comorbilidad especificar: _____
12. ¿Antes de acudir al puesto de salud tomó alguna medicina?
- ☐ Sí
- ☐ No
13. Elija si tomó algunas de estas medicinas y/o sustancias
- ☐ Ivermectina
- ☐ Dióxido de cloro
- ☐ Solución mineral milagrosa o MMS o CDC
- ☐ Hidroxicloroquina
- ☐ Warfarina
- ☐ Heparina
- ☐ Enoxaparina
- ☐ Azitromicina
- ☐ Ceftriaxona
- ☐ Dexametasona
- ☐ Prednisona
- ☐ Paracetamol
- ☐ Aspirina
- ☐ Omeprazol
- ☐ Plantas medicinales
- ☐ No tomé ninguna medicina
- ☐ Otros: _____
14. Si usó este producto, antes de venir al puesto de salud, ¿Quién se lo recetó la medicina de la Medicina que tomó?

	La indicó un familiar	Yo solo elegí tomarla	La indicó un vecino	La indicó un médico	La conoció en redes	La indicó un amigo	Otro	No tomo esta medicina
Ivermectina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dióxido de cloro	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Solución mineral milagrosa o MMS o CDC	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hidroxicloroquina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Heparina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Enoxaparina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azitromicina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ceftriaxona	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prednisona	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Paracetamol	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aspirina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Omeprazol	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Plantas medicinales	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dexametasona	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

15. Otra medicación especificar: _____
16. ¿Tomó dióxido de cloro "solución mineral milagrosa" o MMS, CDS?
☐ Sí
☐ No
17. ¿Cómo era la preparación del Dióxido de cloro "solución mineral milagrosa" o MMS, CDS? _____
18. ¿Para qué molestia tomaba el dióxido de cloro "solución mineral milagrosa" o MMS, CDS? _____
19. ¿Cuánto tiempo toma el dióxido de cloro "solución mineral milagrosa" o MMS, CDS? _____
20. ¿Dónde consiguió el dióxido de cloro "solución mineral milagrosa" o MMS, CDS? _____
21. ¿Quién le recetó el dióxido?
☐ Automedicación
☐ Familiar
☐ Amigo
☐ Vecino
☐ Médico

- ☐ Otro profesional de la salud
☐ No consumí
☐ Otros especifique: _____
22. ¿Qué otra persona le recetó el dióxido?
23. Efectos secundarios del Dióxido de cloro "solución mineral milagrosa" o MMS, CDS:
- ☐ Falla respiratoria
☐ Esofagitis
☐ Metahemoglobinemia
☐ Prolongación del espacio QT en el electrocardiograma
☐ Esofagitis caústica
☐ Diarrea
☐ Vómitos severos
☐ Hipotensión causada por deshidratación
☐ Deshidratación severa
☐ Falla hepática aguda
☐ Anemia hemolítica
☐ Hemólisis aguda
☐ Falla renal
☐ Lesión miocárdica
☐ Trastornos hidroelectrolíticos
☐ Otros
24. Otro efecto secundario especifique: _____
25. Impresión diagnóstica: _____
26. Severidad del COVID 19:
- ☐ Leve
☐ Moderado
☐ Severo
27. Requirió oxígeno:
- ☐ No
☐ Cánula binasal
☐ Mascara de reservorio
☐ Ventilación mecánica
☐ CPAP
☐ Máscara Snorkel
☐ Casco CPAP
☐ Otro
☐ Otro dispositivo para oxígeno especificar: _____
28. Evolución:
- ☐ Alta
☐ Estacionaria
☐ Fallecido
☐ Se trasladó a un centro de salud de mayor nivel de atención

ANEXO 3

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE ENCUESTA

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario

INSTRUCCIONES DEL INSTRUMENTO: PARTICIPACIÓN: Su participación es voluntaria y confidencial. Los resultados no llevarán su nombre o apellido o cualquier data que pueda identificarlo. Si usted acepta ser parte del estudio, esta consintiendo participar en la entrevista y que un investigador miembro del grupo pueda leer su historia clínica hasta ser dado de alta y llamar a un familiar para que amplíe información sobre la medicación utilizada antes de mi ingreso al puesto de salud para atenderme por COVID 19. **DECLARACIÓN:** Yo autorizo de manera voluntaria mi participación en la presente investigación. He sido informado y entendido el propósito del estudio, los procedimientos, el carácter confidencial y voluntario del estudio.

N°	Pregunta	Respuesta	EVALUACION			OBSERVACIONES
			DEJAR	MODIFICAR	ELIMINAR	
1	Edad en años		X			
2	Género	Masculino Femenino	X			
3	Grado de instrucción	Analfabeto Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa Técnico superior Universidad	X			
4	Procedencia (Nombre del distrito)		X			
5	Identifique a qué servicio de salud ha acudido por temas de COVID 19 antes del ingresar al centro de salud	Solo acudí al centro de salud Hospital Regional Honorio Delgado Hospital Goyeneche Hospital EsSalud Clínica particular Otros:	X			
6	Ocupación	Ama de casa Estudiante Personal de Salud Trabajador independiente Trabajador dependiente Otros:	X			
7	Estado nutricional	Bajo peso Normo peso Sobrepeso Obesidad	X			
8	Diagnóstico de COVID 19	Diagnóstico clínico (síntomas) Prueba rápida Prueba molecular Tomografía Otros:	X			
9	Saturación de oxígeno al ingreso Sat O2		X			
10	Comorbilidades	Si No No sabe	X			

11	Comorbilidades	Diabetes mellitus Hipertensión arterial Asma EPOC Enfermedad cardiovascular Obesidad Hepatopatía crónica Enfermedad renal crónica Neoplasia Inmunosupresión Ninguna comorbilidad Otra comorbilidad especificar	X																																																																																																																																										
12	¿Antes de acudir al puesto de salud tomó alguna medicina?	Si No	X																																																																																																																																										
13	Elija si tomó algunas de estas medicinas y/o sustancias	Ivermectina Dióxido de cloro Solución mineral milagrosa o MMS o CDC Hidroxicloroquina Warfarina Heparina Enoxaparina Azitromicina Ceftriaxona Dexametasona Prednisona Paracetamol	X																																																																																																																																										
14	Si usó este producto, antes de venir al puesto de salud, ¿Quién se lo recetó la medicina de la Medicina que tomó?	<table><thead><tr><th></th><th>La indicó un familiar</th><th>Yo solo elegí tomarla</th><th>La indicó un vecino</th><th>La indicó un médico</th><th>La conocí en redes</th><th>La indicó un amigo</th><th>Otro</th><th>No tomo esta medicina</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ivermectina</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dióxido de cloro</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Solución mineral milagrosa o MMS o CDC</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Hidroxicloroquina</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Heparina</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Enoxaparina</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Azitromicina</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ceftriaxona</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Prednisona</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Paracetamol</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Aspirina</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Omeprazol</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Plantas medicinales</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dexametasona</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></tbody></table>		La indicó un familiar	Yo solo elegí tomarla	La indicó un vecino	La indicó un médico	La conocí en redes	La indicó un amigo	Otro	No tomo esta medicina	Ivermectina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Dióxido de cloro	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Solución mineral milagrosa o MMS o CDC	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Hidroxicloroquina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Heparina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Enoxaparina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Azitromicina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ceftriaxona	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Prednisona	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Paracetamol	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Aspirina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Omeprazol	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Plantas medicinales	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Dexametasona	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X			
	La indicó un familiar	Yo solo elegí tomarla	La indicó un vecino	La indicó un médico	La conocí en redes	La indicó un amigo	Otro	No tomo esta medicina																																																																																																																																					
Ivermectina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																					
Dióxido de cloro	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																					
Solución mineral milagrosa o MMS o CDC	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																					
Hidroxicloroquina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																					
Heparina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																					
Enoxaparina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																					
Azitromicina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																					
Ceftriaxona	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																					
Prednisona	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																					
Paracetamol	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																					
Aspirina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																					
Omeprazol	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																					
Plantas medicinales	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																					
Dexametasona	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																					
15	Otra medicación especificar		X																																																																																																																																										
16	¿Tomó dióxido de cloro "solución mineral milagrosa" o MMS, CDS	Si No	X																																																																																																																																										
17	¿Cómo era la preparación del Dióxido de cloro "solución mineral milagrosa" o MMS, CDS		X																																																																																																																																										
18	Para que molestia tomaba el dióxido de cloro "solución mineral milagrosa" o MMS, CDS		X																																																																																																																																										
19	¿Cuánto tiempo toma el dióxido de cloro "solución mineral milagrosa" o MMS, CD		X																																																																																																																																										
20	¿Dónde consiguió el dióxido de cloro "solución mineral milagrosa" o MMS, CDS		X																																																																																																																																										

21	¿Quién le recetó el dióxido?	Automedicación Familiar Amigo Vecino Medico Otro profesional de la salud No consumí	X			
22	¿Qué otra persona le recetó el dióxido?		X			
23	Efectos secundarios del Dióxido de cloro "solución mineral milagrosa" o MMS, CDS	Falla respiratoria Esofagitis Metahemoglobinemia Prolongación del espacio QT en el electrocardiograma Esofagitis cáustica Diarrea Vómitos severos Hipotensión causada por deshidratación Deshidratación severa Falla hepática aguda Anemia hemolítica Hemólisis aguda Falla renal Lesión miocárdica	X			
24	Otro efecto secundario especifique		X			
25	Impresión diagnóstica		X			
26	Severidad del COVID 19	Leve Moderado Severo	X			
27	Requirió oxígeno	No Cánula binasal Máscara de reservorio Ventilación mecánica CPAP Máscara Snorkel Casco CPAP Otro	X			
28	Otro dispositivo para oxígeno especifique		X			
29	Evolución	Alta Estacionaria Fallecido Se trasladó a un centro de salud de mayor nivel de atención	X			

ANEXO 4

CERTIFICADOS DE VALIDEZ

CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DE PARTE DEL EXPERTO

Apreciación cualitativa

El instrumento es adecuado y entendible

Observaciones generales

Sin observaciones, no se incluyó personales, al ser confidencial.

Validado por:	Miguel Salazar Arenas
DNI:	71322401
Profesión:	Médico
Lugar de trabajo:	Hospital Honotio Delgado Espinoza
Cargo que desempeña:	Médico servicio
Fecha:	2 julio 2022
Firma:	



CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DE PARTE DEL EXPERTO

Apreciación cualitativa

Contenido APTO

El instrumento es adecuado .

Observaciones generales

NINGUNA

Validado por:

Dra. Sively Mercado Mamani

DNI:

43700814

Grado académico:

Doctor en Salud Pública

Profesión:

Cirujano - Dentista

Lugar de trabajo:

Docente Universidad San Antonio Abad del Cuzco


Cargo que desempeña:

Docente- Director de Clinica Odontológica

Fecha:

06-07-22

Firma:



CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DE PARTE DEL EXPERTO

Apreciación cualitativa

Si es un instrumento comprensible

Observaciones generales

Se resolvieron las observaciones

Validado por: Giancarlo Christian Alvarez Cervantes

DNI: 41360271

Grado académico: Magister en Bioquímica y Biología Molecular

Profesión: Químico-Farmacéutico

Lugar de trabajo: UCSM

Cargo que desempeña: Docente

Fecha: 06/07/2022

Firma:


Q.F. Giancarlo Alvarez C.
DIRECTOR TÉCNICO
- 12876 -

ANEXO 5

MATRIZ DE DATOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	Femenino	Primaria incompleta	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Obesidad	Prueba rápida	72	Si	2	Diabetes mellitus, Obesidad	si		Si
61	Masculino	Secundaria incompleta	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba Rápida	87	Si	>2	HTA, diabetes, Sobrepeso	si	si	
60	Femenino	Primaria incompleta	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba rápida	92	Si	2	Sobrepeso, Otro: Problemas de columna			
32	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Construcción	Normo peso	Prueba rápida	93	No	0	Ninguna comorbilidad			
45	Femenino	Universitario	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Dependiente, Docente	Sobrepeso	Prueba rápida	93	Si	1	Sobrepeso			
56	Masculino	Universitario	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente	Sobrepeso	Prueba rápida	84	Si	1	Sobrepeso			
43	Femenino	Primaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Normo peso	Prueba rápida	92	Si	1	Otro: Tumor de Ovario			
24	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Sobrepeso	Prueba molecular	93	Si	1	Sobrepeso			
24	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Sobrepeso	Prueba molecular	93	Si	1	Sobrepeso			
24	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Sobrepeso	Prueba rápida	94	Si	1	Sobrepeso			
19	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Normo peso	Prueba rápida	94	No	0	Ninguna comorbilidad			
47	Masculino	Primaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Zapatero	Obesidad	Prueba rápida	92	Si	1	Obesidad, Peso 81, talla 1.57			
40	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, CONSTRUCCIÓN	Obesidad	Prueba rápida	92	Si	2	Obesidad, Otros: Gastritis			
58	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba rápida	87	Si	2	Sobrepeso, Otros: Artrosis			
36	Femenino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Aduanera	Normo peso	Prueba rápida	96	Si	1	Otros: Gastritis			
22	Masculino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, SOLDADOR	Normo peso	Prueba rápida	94	No	0	Ninguna comorbilidad			
33	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba rápida	96	Si	1	Sobrepeso			
59	Femenino	Primaria incompleta	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Obesidad	Prueba rápida	93	Si	2	Hipertensión arterial, Obesidad	si	si	
35	Masculino	Universitario	M. Melgar	Otro: Farmacia	Dependiente, Ingeniero seguridad	Obesidad	Prueba rápida	95	Si	>2	Asma, Obesidad talla 1.67 peso 88, Otros: Gastritis		si	
27	Femenino	Universitario	M. Melgar	Otro: farmacia	Independiente, Comerciante	Sobrepeso	Prueba rápida	94	Si	1	Sobrepeso			
33	Masculino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Operario de construcción civil	Sobrepeso	Prueba rápida	94	Si	1	Sobrepeso			
37	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Otro: Acudió al centro de salud Alto San Martín	Independiente, Albañil	Obesidad	Prueba rápida	92	Si	1	Obesidad		si	
47	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Construcción	Sobrepeso	Prueba rápida	94	Si	1	Sobrepeso			
18	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Normo peso	Prueba rápida	94	No	0	Ninguna comorbilidad			
40	Femenino	Universitario	M. Melgar	Otro: Farmacia	Independiente, Operadora	Obesidad	Prueba rápida	92	Si	1	Obesidad		si	
38	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Obesidad	Prueba rápida	92	Si	1	Obesidad		si	
63	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba rápida	93	Si	1	Sobrepeso			
58	Femenino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Normo peso	Prueba rápida	94	No	0	Ninguna comorbilidad			
45	Masculino	Universitario	Miraflores	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Delivery	Obesidad	Prueba rápida	86	Si	1	Obesidad		si	
67	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, TAXISTA	Sobrepeso	Prueba rápida	91	Si	1	Sobrepeso			
45	Femenino	Primaria incompleta	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, AMBULANTE	Sobrepeso	Prueba rápida	92	Si	1	Sobrepeso			
55	Femenino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Normo	Prueba rápida	9	No	0	Ninguna comorbilidad			

5				Melgar*		peso		4	o			
2	Masculin	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Normo peso	Prueba rápida	9	N	0		Ninguna comorbilidad
7	o							5	o			
3	Masculin	Universitario	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Personal de salud, PSICÓLOGO	Sobrepeso	Prueba rápida	9	Si	1		Sobrepeso
1	o							2				
6	Femenino	Universitario	M. Melgar	Hospital Goyeneche	Independiente, Mecánica dental	Normo peso	Prueba rápida	9	N	0		Ninguna comorbilidad
2								1	o			
7	Masculin	Analfabeto	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Obesidad	Prueba rápida	8	Si	2		Hipertensión Arterial, Otros: HBP
4	o							8			si	
4	Masculin	Secundaria incompleta	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, TAXISTA	Normo peso	Prueba rápida	9	N	0		Ninguna comorbilidad
9	o							3	o			
2	Masculin	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Sobrepeso	Prueba rápida	9	Si	2		Sobrepeso, Enfermedad Cardiovascular: EPISODIOS DE TAQUICARDIA
9	o							6				
3	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba rápida	9	Si	1		Sobrepeso
4								5				
4	Masculin	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, MECÁNICO	Obesidad	Prueba rápida	9	Si	2		Obesidad, Otros: Hiperuricemia
9	o							3			si	
4	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente	Obesidad	Prueba rápida	9	N	0		Ninguna comorbilidad
4								4	o			
2	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Normo peso	Prueba rápida	9	N	0		Ninguna comorbilidad
6								6	o			
2	Femenino	secundaria completa	M. Melgar	Otro: Farmacia	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba rápida	9	Si	2		Sobrepeso, Hipertensión Arterial
9								8			si	
4	Masculin	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Comerciante	Normo peso	Prueba rápida	9	N	0		Ninguna comorbilidad
5	o							3	o			
2	Masculin	secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Soldador	Normo peso	Prueba rápida	9	N	0		Ninguna comorbilidad
5	o							4	o			
6	Femenino	Analfabeto	M. Melgar	Otro: Medico Particular y C. S. Cuzco	Ama de casa	Normo peso	Prueba rápida	9	Si	1		TBC PULMONAR
5								6				
2	Masculin	secundaria completa	CERCADO	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, VISITADOR MÉDICO	Sobrepeso	Prueba rápida	9	Si	2		Sobrepeso, Asma (salbutamol)
2								8				
4	Masculin	secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, CONSTRUCCIÓN	Obesidad	Prueba molecular	9	Si	1		Obesidad
7	o							3			si	
3	Masculin	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Comerciante	Normo peso	Prueba rápida	9	N	0		Ninguna comorbilidad
5	o							4	o			
4	Femenino	secundaria completa	M. melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Obesidad	Prueba rápida	9	Si	1		Obesidad
6								4			si	
3	Femenino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Normo peso	Prueba rápida	9	N	0		Ninguna comorbilidad
0								6	o			
3	Femenino	Universitario	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, LIMPIEZA	Sobrepeso	Prueba rápida	9	Si	1		Sobrepeso
5								2				
6	Masculin	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba molecular	9	Si	2		Sobrepeso, Hipertensión arterial
4	o							4			si	
2	Masculin	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Normo peso	Prueba molecular	9	N	0		Ninguna comorbilidad
3	o							6	o			
4	Femenino	Técnico superior	M. Melgar	Otro: Acudi al centro de salud Miraflores	Ama de casa	Obesidad	Prueba rápida	7	Si	1		Obesidad
5								3				
3	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, COCINERA	Normo peso	Prueba rápida	9	N	0		Ninguna comorbilidad
1								6	o			
2	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, COMERCIANTE	Normo peso	Prueba rápida	9	N	0		Ninguna comorbilidad
5								8	o			
3	Masculin	Primaria completa	M. Melgar	Hospital Goyeneche	Independiente, Confección de calzado	Sobrepeso	Prueba rápida	9	Si	1		Sobrepeso
2								0				
4	Femenino	secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Comerciante	Obesidad	Prueba molecular	8	Si	1		Obesidad
4								8			si	
2	Masculin	secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Sobrepeso	Prueba molecular	9	Si	2		Sobrepeso, Hipertigliceridemia, 68.9.
3	o							4				
3	Femenino	Universitario	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente	Normo peso	Prueba molecular	9	N	0		Ninguna comorbilidad
2								2	o			
4	Femenino	Universitario	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Dependiente	Normo peso	Prueba molecular	9	Si	1		Otros: Úlcera gástrica
7								4				
2	Femenino	Universitario	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Profesora	Sobrepeso	Prueba rápida	9	Si	2		Ovario poliquístico, sobrepeso
9								2				
3	Femenino	Universitario	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente	Normo peso	Prueba molecular	8	Si	1		Otros: Tabique desviado
6								3				
2	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Normo peso	Prueba rápida	9	N	0		Ninguna comorbilidad
1								3	o			
3	Masculin	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Músico	Obesidad	Prueba rápida	9	Si	1		Obesidad
3								9			si	
4	Femenino	Universitario	M. Melgar	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba molecular	9	Si	2		Sobrepeso, Acné
3								3				
5	Masculin	Universitario	Paucarpata	Solo acudi al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente	Normo peso	Prueba molecular	9	N	0		Ninguna comorbilidad
5	o							2	o			

38	Masculino	Técnico superior	Cercado	Otro: Farmacia	Dependiente, Telecomunicaciones	Sobrepeso	Prueba molecular	90	Si	1	Sobrepeso		
60	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Comerciante	Sobrepeso	Prueba molecular	78	Si	> 2	Sobrepeso, Artritis Reumatoidea, fibromialgia, exposición biomasa		
30	Femenino	secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Comerciante licorería	Normo peso	Prueba rápida	99	No	0	Ninguna comorbilidad		
45	Femenino	Secundaria completa	Cercado	Otro: Clínica particular "Espíritu Santo"	Independiente, Comerciante	Sobrepeso	Prueba rápida	92	Si	1	Sobrepeso		
48	Masculino	Secundaria completa	Cercado	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Comerciante	Sobrepeso	Prueba molecular	94	Si	1	Sobrepeso		
53	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Hospital Goyeneche	Ama de casa	Obesidad	Prueba rápida	92	Si	> 2	Hipertensión arterial, Obesidad, Otros: Gastritis	si	si
76	Femenino	Analfabeto	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba rápida	90	Si	> 2	Sobrepeso, Hipertensión arterial, Enfermedad cardiovascular: ACV 2017, Otros: Osteoporosis	si	
35	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba rápida	96	Si	2	Sobrepeso, Enfermedad cardiovascular, Soplo cardíaco		
57	Masculino	Analfabeto	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Expende comida	Normo peso	Prueba rápida	94	No	0	Ninguna comorbilidad		
49	Femenino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Comerciante abarrotes	Normo peso	Prueba rápida	93	No	0	Ninguna comorbilidad		
24	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Sobrepeso	Prueba rápida	93	Si	1	Sobrepeso		
59	Masculino	secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Panadero	Normo peso	Prueba rápida	89	No	0	Ninguna comorbilidad		
60	Femenino	Primaria incompleta	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Obesidad	Prueba rápida	94	Si	> 2	Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Obesidad, Otros: Reumatismo	si	si
36	Masculino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, CONDUCTOR	Normo peso	Prueba rápida	94	No	0	Ninguna comorbilidad		
19	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Dependiente, MILITAR	Normo peso	Prueba rápida	95	No	0	Ninguna comorbilidad		
21	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Otro: Hospital Militar	Dependiente	Normo peso	Prueba rápida	91	No	0	Ninguna comorbilidad		
48	Femenino	Universitario	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Normo peso	Prueba rápida	90	Si	1	Otros: Gastritis		
22	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Obesidad	Prueba rápida	95	Si	1	Obesidad		si
62	Femenino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Normo peso	Prueba rápida	90	Si	1	Otros: Dolícomegalon		
21	Masculino	secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	ESTUDIANTE	Normo peso	Prueba rápida	96	No	0	Ninguna comorbilidad		
69	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, CONSTRUCCIÓN	Obesidad	Prueba rápida	95	Si	> 2	Obesidad, Hipertensión arterial, IMA	si	si
45	Femenino	Universitario	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Docente	Normo peso	Prueba rápida	95	No	0	Ninguna comorbilidad		
23	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Normo peso	Prueba molecular	93	No	0	Ninguna comorbilidad		
20	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Sobrepeso	Prueba rápida	97	Si	1	Sobrepeso		
19	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Sobrepeso	Prueba rápida	96	Si	1	Sobrepeso		
36	Femenino	Universitario	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Obesidad	Prueba molecular	94	Si	1	Obesidad		si
41	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente	Obesidad	Prueba rápida	98	Si	1	Obesidad		si
83	Femenino	Primaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa, JUBILADA	Sobrepeso	Prueba rápida	92	Si	2	Sobrepeso, Hipertensión arterial	si	
45	Masculino	Primaria completa	M. Melgar	Otro: Acudió al Centro de Salud "Atalaya"	Independiente, Afanador zapatillas	Normo peso	Prueba molecular	87	Si	2	Diabetes mellitus, Otros: SD. Depresivo en tto	si	
48	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Normo peso	Prueba rápida	91	No	0	Ninguna comorbilidad		
57	Femenino	Universitario	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Obesidad	Prueba rápida	93	Si	1	Obesidad		si
57	Femenino	Universitario	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Personal de salud, Odontóloga	Normo peso	Prueba rápida	84	No	0	Ninguna comorbilidad		
64	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Normo peso	Prueba rápida	90	Si	1	Hipertensión arterial	si	
#	Masculino	Primaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Normo peso	Prueba rápida	93	Si	> 2	Asma, Fibrosis, Enfermedad cardiovascular: portador de marcapaso		
79	Masculino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Jubilado	Sobrepeso	Prueba rápida	90	Si	1	Sobrepeso		
54	Femenino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Comerciante	Sobrepeso	Prueba rápida	96	Si	1	Sobrepeso		
7	Masculino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Jubilado	Normo	Prueba rápida	8	Si	1	Diabetes mellitus	si	

4

56	Femenino	Secundaria incompleta	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba rápida	90	Si	1	Sobrepeso	
53	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, CONDUCTOR, jubilado PNP	Obesidad	Prueba rápida	93	Si	1	Obesidad. Peso 118, Talla 1,7	si
57	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba rápida	95	Si	2	Sobrepeso, Hipertensión arterial	si
64	Masculino	Universitario	M. Melgar	Otro: Acudió al Hospital Militar	Independiente, ODONTÓLOGO	Obesidad	Prueba rápida	85	Si	1	Otros: PARKINSON	
31	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Normo peso	Prueba rápida	95	No	0	Ninguna comorbilidad	
52	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Dependiente, Saneamiento ambiental	Sobrepeso	Prueba rápida	93	Si	1	Sobrepeso	
36	Femenino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente	Normo peso	Prueba rápida	92	No	0	Ninguna comorbilidad	
89	Masculino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente	Obesidad	Prueba rápida	99	Si	1	Obesidad	si
31	Femenino	secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Normo peso	Prueba rápida	98	No	0	Ninguna comorbilidad	
32	Femenino	Universitario	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba rápida	91	Si	1	Sobrepeso	
97	Femenino	primaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Normo peso	Prueba molecular	89	No	0	Ninguna comorbilidad	
25	Masculino	secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente	Obesidad	Prueba rápida	94	Si	1	Obesidad	si
22	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Normo peso	Prueba rápida	93	No	0	Ninguna comorbilidad	
60	Femenino	primaria incompleta	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Sobrepeso	Prueba molecular	93	Si	1	Sobrepeso	
25	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Otros: Farmacia	Estudiante	Normo peso	Prueba rápida	98	Si	1	TBC	
30	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Comerciante	Sobrepeso	Prueba rápida	94	Si	1	Sobrepeso	
30	Femenino	Universitario	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente	Obesidad	Prueba molecular	96	Si	1	Obesidad	si
37	Femenino	Universitario	M. Melgar	Otro: Farmacia	Dependiente, Psicóloga en colegio	Sobrepeso	Prueba molecular	93	Si	1	Sobrepeso	
34	Femenino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Obesidad	Prueba molecular	95	Si	1	Obesidad	si
55	Femenino	primaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Obesidad	Prueba molecular	93	Si	> 2	Obesidad, Artritis Reumatoidea, gastritis crónica	si
37	Masculino	Técnico superior	M. Melgar	Otro: Farmacia	Independiente, Maestro de ceremonia	Normo peso	Prueba rápida	94	No	0	Ninguna comorbilidad	
29	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Normo peso	Prueba rápida	98	No	0	Ninguna comorbilidad	
23	Masculino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Obesidad	Prueba molecular	87	Si	1	Obesidad	si
22	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Normo peso	Prueba rápida	86	No	0	Ninguna comorbilidad	
69	Masculino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Comerciante	Obesidad	Prueba rápida	99	Si	1	Obesidad	si
63	Masculino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Chofer	Obesidad	Prueba molecular	93	Si	1	Obesidad	si
21	Masculino	Secundaria completa	J. L. B. Y Rivero	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Sobrepeso	Prueba rápida	95	Si	1	Sobrepeso	
58	Femenino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Obesidad	Prueba rápida	89	Si	> 2	Obesidad, Otros: Hipotiroidismo, Enfermedad Cardiovascular: Trombosis	si
36	Femenino	Secundaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Estudiante	Sobrepeso	Prueba molecular	94	Si	1	Sobrepeso	
30	Masculino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Mecánico	Obesidad	Prueba molecular	92	Si	1	Obesidad	si
47	Masculino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Obesidad	Prueba rápida	91	Si	1	Obesidad, peso 95, talla 1.7	si
61	Masculino	Universitario	Miraflores	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Ingeniero electrónico	Normo peso	Prueba rápida	86	No	0	Ninguna comorbilidad	
79	Masculino	Universitario	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Normo peso	Prueba rápida	93	No	0	Ninguna comorbilidad	
36	Femenino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Cortadora	Normo peso	Prueba rápida	97	No	0	Ninguna comorbilidad	
41	Masculino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Electricista mecánico	Sobrepeso	Prueba rápida	97	Si	1	Sobrepeso	
68	Masculino	Técnico superior	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Jubilado del ejército	Normo peso	Prueba molecular	96	No	0	Ninguna comorbilidad	
3	Femenino	Primaria completa	M. Melgar	Solo acudió al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Ama de casa	Normo peso	Prueba rápida	99	No	0	Ninguna comorbilidad	

6



78	Masculino	Primaria incompleta	M. Melgar	Otro: Acudí a EsSalud	Jubilado	Bajo peso	Prueba molecular	91	No	0	Ninguna comorbilidad
31	Masculino	Universitario	M. Melgar	Solo acudí al Centro de Salud "Mariano Melgar"	Independiente, Preguntar	Normo peso	Prueba molecular	92	No	0	Ninguna comorbilidad

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Si	Si	Dióxido de cloro, Plantas medicinales	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Dióxido de cloro, Plantas medicinales	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
si	si	Si	Si	Dióxido de cloro, Plantas medicinales	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Dióxido de Cloro, Plantas medicinales, Ivermectina, Paracetamol	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	Si
si		Si	Si	Plantas medicinales, Panadol, doloforte	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si		Si	Si	Plantas medicinales, Ceftriaxona, Dexametasona, Azitromicina, Paracetamol, Ivermectina	Si	Si	No	No	No	No	Si	No	No	Si
		Si	Si	Dióxido de cloro, Ivermectina, Plantas medicinales	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Paracetamol, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Paracetamol, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Ivermectina	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Antalgina, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Paracetamol, Losartan e hidroclorotiazida, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
	si	Si	Si	Azitromicina, omeprazol, diclofenaco, paracetamol	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	Si
si		Si	Si	Plantas medicinales, Paracetamol, Ibuprofeno	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si		Si	Si	Plantas medicinales, Paracetamol	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Si	Si	Ivermectina, Azitromicina, Omeprazol	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ivermectina, plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ceftriaxona, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No
		Si	Si	Paracetamol, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Paracetamol, Ivermectina, Ceftriaxona, Dexametasona, Omeprazol, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si		Si, solo plantas medicinales	Si	Plantas medicinales, Dióxido de Cloro, Ceftriaxona y Dexametasona	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Paracetamol, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Azitromicina, Plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	si	No	No	Plantas medicinales, Azitromicina, Paracetamol, Dexametasona	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	Si
		Si, solo plantas medicinales	Si	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si	si	No	No	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	si	Si	Si	Azitromicina, Dióxido de Cloro, Ivermectina, Paracetamol	No	Si	No	No	No	No	Si	No	No	No
		Si	Si	Azitromicina, Paracetamol, Aspirina, IBUPROFENO	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Amoxicilina, Ibuprofeno, Azitromicina, Loratadina, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No
si		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Paracetamol, Dióxido de cloro	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Si	Si	Ivermectina (prevención)	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ceftriaxona, Dexametasona, Paracetamol, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si		Si	Si	Paracetamol	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Azitromicina, Paracetamol, Ibuprofeno, dextrometorfan, clorfenamina, Plantas Medicinales	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	Si
		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Azitromicina, Paracetamol, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si		Si	Si	Ivermectina de uso Veterinario, ENALAPRIL	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Paracetamol, Ivermectina, Plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Si	Si	Ceftriaxona, Dexametasona, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No
		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

si		Si	Si	Paracetamol, Plantas medicinales, Dexametasona	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si	si	Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	si	Si	Si	Azitromicina, prednisona	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	No
si	si	Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	si	Si	Si	Azitromicina, paracetamol x 1 sem	No	Si	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	Si
		No	Si	Ivermectina por 3 meses	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Paracetamol, Dióxido de cloro, Plantas medicinales	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si	si	Si	Si	Ibuprofeno, Plantas Medicinales, Plata coloidal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas Medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Ivermectina, paracetamol, ibuprofeno	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si	si	Sí, solo plantas medicinales	Si	Prednisona, Plantas Medicinales (eucalipto)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales (matico, eucalipto)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		No	Si	Azitromicina, Paracetamol, Ivermectina	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Paracetamol	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
	si	Si	Si	Paracetamol, Inyección dexametasona y atb, Ivermectina, Plantas medicinales	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si	si	Sí, solo plantas medicinales	Si	Plantas medicinales, Aspirina	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si	si	Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Ivermectina, paracetamol	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Si	Si	Ivermectina, paracetamol, plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
	si	Si	Si	Paracetamol, AMOXICILINA, dexametasona	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	Si	Dióxido de cloro, Azitromicina, Ibuprofeno, diclofenaco	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	si	Si	Si	Ivermectina, Azitromicina, Dexametasona, Paracetamol, Plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	Si
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales (kion)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	si	Si	Si	Paracetamol, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Si	Si	Azitromicina, Levofloxacino, celecoxib	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	No
	si	Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Dióxido de cloro, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Paracetamol, Ivermectina, Plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si		Si	Si	Paracetamol, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	si	Si	Si	Ivermectina, Plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Azitromicina, Paracetamol	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	Si
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ivermectina, dióxido de cloro	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	si	Sí, solo plantas medicinales	Si	Dexametasona, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Paracetamol, Plantas medicinales, Dióxido de cloro	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si		Si	Si	Ivermectina, Dióxido de Cloro, Plantas medicinales	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Paracetamol, Plantas medicinales, oxígeno medicinal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
	si	No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Azitromicina, Paracetamol, Ivermectina, Prednisona, Plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	Si
		Si	Si	Lincomicina inyectable	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	Si	Ivermectina, Paracetamol	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Paracetamol	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
	si	No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	si	Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ivermectina, Plantas medicinales (kion)	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Paracetamol, Plantas Medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si	si	No	Si	Meloxicam, Sulfazalacina	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Ceftriaxona, Lincomicina	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No
		Si	Si	Vytapirena (paracetamol + fenilefrina)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
	si	Si	Si	Ivermectina, Plantas medicinales, gargaras de sal	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ivermectina, Paracetamol, Plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		No	Si	Dióxido de cloro, Ivermectina	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Paracetamol, Ivermectina	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Si	Si	Paracetamol, Ivermectina	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ceftriaxona, dexametasona, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No
		Si	Si	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ivermectina, Plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	Si	Azitromicina, Beclometasona y salbutamol	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Plantas medicinales, Dolocordralan	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Sí, solo plantas medicinales	Si	Cefepime, paracetamol, Plantas medicinales, Azitromicina	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si, solo plantas medicinales	Si	Dexametasona, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Plantas medicinales (eucalipto, matico), Paracetamol, ibuprofeno	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Lincomicina (3 dosis), Plantas medicinales (eucalipto)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	si	Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Doloquimagnesico, prednisona, hidroxycloquin, Plantas medicinales (eucalipto)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Dexametasona, Ketorolaco, Azitromicina, enoxaparina	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si	si	No	Si	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Paracetamol, Ivermectina, Plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Si	Si	Paracetamol, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	si	Si	Si	Dexametasona, Bencil penicilina 3 veces, Ivermectina, Azitromicina, Aspirina, Paracetamol, Ibuprofeno, Plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	No	Si
		Si	Si	Amoxicilina x 4 días, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Ivermectina, Dióxido de cloro	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ivermectina, oxígeno medicinal	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ivermectina, plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Paracetamol	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ivermectina, plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Paracetamol, plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ivermectina, azitromicina, dexametasona, Plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Ivermectina, paracetamol, plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Ivermectina, Ceftriaxona	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No
		Si	Si	Paracetamol, plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
	si	Sí, solo plantas medicinales	Si	Dexametasona, ceftriaxona, omeprazol, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ivermectina de uso veterinario	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ivermectina, Azitromicina, omeprazol, plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Paracetamol	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Si	Si	Dióxido de cloro	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ivermectina	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Nastizol	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	si	No	Si	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Paracetamol	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Si	Si	Azitromicina, Paracetamol, Apronax, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Si	Si	Plantas medicinales, Dióxido de cloro	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	si	Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si	si	Si	Si	Ivermectina (1 VEZ), Plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Paracetamol, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	si	Si	Si	Dióxido de cloro, Azitromicina, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Ivermectina, Paracetamol, Plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
		No	No	No tomé ninguna medicación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Dióxido de cloro, Plantas medicinales	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Si	Si	Ivermectina, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		Sí, solo plantas medicinales	Solo plantas medicinales	Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	Si	Aziromicina	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
		No	Si	Ceftriaxona	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si	si	No	Si	Ceftriaxona	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Paracetamol, Plantas medicinales	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si
si		No	Si	Otro: salbutamol	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
si		Si	Si	Paracetamol, Ivermectina, Azitromicina, Plantas medicinales	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si

Plantas medicinales
Paracetamol, Plantas medicinales
Ivermectina de uso Veterinario
Plantas medicinales
Ceftriaxona, Dexametasona, Paracetamol, Plantas medicinales

Paracetamol, Plantas medicinales

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

No	No	No	No	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina
No	No	Si	No	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina
No	No	Si	No	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina
No	No	Si	Si	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina
No	No	Si	No	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina
No	No	Si	Si	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina
No	No	No	No	La indicó un familiar	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina
No	No	Si	No	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina
No	No	Si	Si	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina
No	No	Si	No	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina
No	No	Si	No	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina
No	No	Si	No	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina
No	No	Si	No	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina
No	No	Si	No	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina

46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	Metformina	Si	5ml en 1 litro de agua	Dificultad respiratoria	2 días	Laboratorio			Químico farmacéutico		COVID CONFIRMADO	Leve	Cánula binasal, Máscara de reservorio		Se trasladó a un centro de salud de mayor nivel de atención
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	Si	5ml en 1 litro de agua	Dificultad respiratoria	4 días	Familiar			Familiar		COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	Si	5ml en 1 litro de agua	Dificultad respiratoria	4 días	Familiar			Familiar		COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	No tomo esta medicina	No	Si	5ml en 1 litro de agua	Dificultad respiratoria	15 días	Familiar			Familiar		COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	Vitamina C	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	La indicó un médico	No	Si	5ml en 1 litro de agua	Dificultad respiratoria	2 días	Amigo	Amigo		Disminución de dificultad respiratoria		COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	Si	3 gotas en 1 litro de agua	Tos	1 día	Familiar			Familiar		COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No		Ivermectina dificultad respiratoria					Ivermectina 4 días		COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	Antalgina - Otro farmacia	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	Losartan e hidroclorotiazida por hta	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta

[illegible]

No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No	no	no	no	no	no	no	no	COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No	4gotas de cada u a 30 seg en medio vaso de agua	para prevenir	1 mes	clientes	cliente	no	clienta, le compartio a familiares	COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No								COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	La indicó un médico	No	No								COVID POSITIVO/TBC PULMONAR(TEM)/NEUMONÍA BASAL DERECHA	Moderado	canula binasal		Se traslado a un centro de salud de mayor nivel de atención
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	Panadol, etoricoxib 60mg, Salbutamol	No								COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No								COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	No tomo esta medicina	No	No								COVID confirmado, bronquitis	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No								COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No								COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No								COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No								COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No		Ivermectina Prevención	Ivermectina vecino	Amigo				COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No		Prevención	1 día					COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	Otro: Farmacia	No	No								COVID CONFIRMADO	Leve	Cánula Binasal		Se traslado a un centro de salud de mayor nivel de atención
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No								COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No								COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	Otro: Farmacia	Antigripal trioval	No								COVID CONFIRMADO	Leve	Cánula binasal		Se traslado a un centro de salud de mayor nivel de atención
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No								COVID CONFIRMADO	Moderado	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	No tomo esta medicina	No	No								COVID POSITIVO/ HIPERTRIGLICERIDEMIA	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No								COVID POSITIVO/ ASMA	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No								COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No								COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	Si	1 tapa sin disolver	Prevención	1 vez	Laboratorio químico	Químico - farmacéutico	Falla respiratoria, malestar general, náuseas, epigastralgia		COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No		Ivermectina 15 gotas en 1 vaso de agua, 2v/día por 3 meses	Ivermectina						COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	Si	3-4 gotas en 1 litro 1 vez	Prevención	1 vez					COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo	No tomo esta medicina	Plata coloidal y cancha lagua	Plata	5ml mañana, tarde y noche (Ag y Zn)							COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta

esta medicina	elegí tomarla	medicina		coloidal - prevencion										e			
No tomo esta medicina	La conocí en redes	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	Ivermectina	Ivermectina 3gotas por 3 días	ivermectina: malestar general		FARMACIA ivermectina		nauseas por ivermectina			COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	azatioprina, etodolol, prednisona por tratamiento mas de 10 años - La indicó un médico	No									COVID CONFIRMADO	Modrado	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	La indicó un médico	Captopril	Si		Dificultad respiratoria	1 vez	Por un amigo	Amigo	Diarrea			COVID POSITIVO/HTA	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	Enalapril/ amlodipino/ atorvastatina/ aspirina	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La indicó un amigo	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	La indicó un médico	Enalapril	Si	1 tapa en 1 litro	Dolor de espalda, agitación	1 semana	Por un amigo	Familiar	No			COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Se trasladó a un centro de salud de mayor nivel de atención
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	Si	2cucharadas en 650 ml de agua	Agitación	aprox 4 veces	En una clínica	Médico	No			COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	La indicó un médico	Se automedicó porque refiere no recibí la atención adecuada	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	LEVOFLOXACINO, CELECOXIB	No		TOS, DOLOR							COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO, DIFICULTAD RESPIRATORIA	Modrado	Máscara de reservorio		Fallecido
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	Si	100ml de CDS en 950 ml de agua	Prevención	1 año	Delivery Cuzco	Médico				COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta

No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No		Prevención	1 día						COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	No tomo esta medicina	Ibuprofeno	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	Enalapril	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	Metformina, Glibenclamida	No									COVID CONFIRMADO	Leve	Cánula binasal, Máscara de reservorio		Se traslado a un centro de salud de mayor nivel de atención
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	Si	4 gotas en 1 litro de agua, no recuerda bien	Malestar general	3 días	Por una amiga	Amigo	Falla respiratoria			COVID CONFIRMADO	Moderado	Cánula binasal		Se traslado a un centro de salud de mayor nivel de atención
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	La indicó un médico	Telmisartan, Naproxeno, Amoxicilina ac clavulánico, PNC, Procinica - La indicó un médico	No									COVID CONFIRMADO	Moderado	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	Si	4 gotas en 1 litro de agua	Prevención	10 días	Recomendó un familiar	Familiar	Ninguno			COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La conocí en redes	No tomo esta medicina	No	Si	3 gotas en 1 litro de agua	Prevención	1 vez (medio vaso)	Recomendó un familiar	Familiar	Ninguno			COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	No tomo esta medicina	Metformina	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	Lincomicina inyectable - Farmacia	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No						Ivermectina diarrea			COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No			Ivermectina 2 veces						COVID CONFIRMADO	Moderado	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La conocí en redes	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	Meloxicam, sulfazalacina - La indicó un médico	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	Lincomicina	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta

[illegible]

No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID POSITIVO/ VIH POSITIVO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No				ivermectina 2 veces					COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	Metformina intermitente	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	Losartán	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	La indicó un médico	BIPERIDENO, LEVODOPA PARA PARKINSON	No									COVID CONFIRMADO	Modificado	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	Amoxicilina - Otro farmacia	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	Si	5ml en 1l de agua	dificultad respiratoria	3 días	Amigo	Amigo		Niega		COVID CONFIRMADO	Leve	Máscara de reservorio		Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	oxigeno medicinal- yo solo la elegí	No							Ivermectina para prevención		COVID CONFIRMADO	Leve	Cánula binasal		Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No							Ivermectina para prevención		COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	Nastiflu, Naproxeno - otro: farmacia	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Falleció
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No							Ivermectina para prevención y dolor de cabeza		COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	Si	3-4 gotas por 1 litro	dióxido por dificultad respiratoria	1 semana	en un consultorio particular por el seguro social	Médico	Sintió mejor	Médico	Niega	COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
La indicó un médico	Yo solo elegí tomarla	La indicó un médico	Diclofenaco - la indicó un médico	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No							Ivermectina Prevención		COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
La indicó un médico	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No									COVID CONFIRMADO	Modificado	Cánula binasal y Máscara de reservorio		Se traslado a un centro de salud de mayor nivel de atención
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	Si	3 gotas en 500 ml 3veces al día	Malestar general	2 semanas	Por un amigo	Amigo	No			COVID CONFIRMADO	Modificado	No	No	Alta

	Azitromicina	prevención				
Litro de 8hrs)	Prevención	3 días	Por un amigo	Amigo		
	Ivermectina prevencion	Ivermectina 3 veces			Ivermectina - ninguna	
agua con óxido de cobre	Dificultad respiratoria, fiebre	15 días	Amigo	Amigo		

esta medicina	elegí tomarla	medicina													e				
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	Beclometasona, salbutamol	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No											COVID CONFIRMADO	Mo der ado	No		Se traslado a un centro de salud de mayor nivel de atención
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No											COVID CONFIRMADO, INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, HTA	Mo der ado	Cánula binasal, máscara de reservorio	Se traslado a un centro de salud de mayor nivel de atención	
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	No tomo esta medicina	No	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	Salbutamol	No	Cloruro de Mg: 1 cta en 1 vaso con limon	Ivermectina: Prevención y Cloruro de Mg: gastritis	1 mes								COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	Si	4ml en 1 litro de agua	Dificultad respiratoria	1 día	Al frente de UNSA	Familiar						COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	Losartan	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	Si	10 ml en 1 litro	Prevención	3 meses	Consultorio de Omeopata	Omeopata						COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	La indicó un médico	No	Si	1 litro	Prevención y Dificultad respiratoria	1 semana	Delivery							COVID CONFIRMADO	Mo der ado	Máscara de reservorio	Se traslado a un centro de salud de mayor nivel de atención	
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	Diclofenaco - médico particular	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	Yo solo elegí tomarla	No	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	Yo solo elegí tomarla	No	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No tomo esta medicina	No	No	Ivermectina veterinaria 5gts en 1 vaso de té	Ivermectina Prevención	Ivermectina 2 meses	Familiar	Familiar						COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	No tomo esta medicina	No	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	Otro: Farmacia	No	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	No	No											COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta

medicina	tomarla																	
No tomo esta medicina	La indicó un familiar	No tomo esta medicina	No	No										COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta
No tomo esta medicina	Yo solo elegí tomarla	No tomo esta medicina	Naproxeno	No	Prevención									COVID CONFIRMADO	Leve	No	No	Alta

